| | [事業主体 | 名] | | | [事業主体 | :名] | | | [事業主体 | :名] | | |
|--|----------------|---------|-----------|----------|----------------|--------|------------|----------|----------------|--------|-------|----------|
| | 14 - 00 | 01 神系 | 泉川県 | | 14 - 0 | 01 神季 | 急川県 | | 14 - 00 |)1 神奈 | 川県 | |
| | 横浜市 | . 112 | 127-1712 | | 横浜市 | | 147-1714 | | 横浜市 | . 1124 | 7.171 | |
| | 供/共川 | | | | (世/共川) | | | | (世/共川) | | | |
| | [浄水場名 | .1 01 - | 00 | | 海水場名 | 1 02 - | 00 | | [浄水場名 |] 03 - | 02 | |
| | 川井浄水 | _ | | -L+A | 25 1 | - | | -L+A) | | - | | -L+A) |
| | 川井净水 | 场(炽水干 | - 5 专 十 桁 | 小性) | 西谷浄水: | 场(尿水干 | 2万十桁 | 八性) | 小雀浄水 | 场(尿水干 | 2万十桁. | 八性) |
| 検査項目 | [水源名] 相模川水 | 系(道志川 | 1) | | [水源名] 相模川水 | 系(相模為 | 月) | | [水源名] 相模川水 | 系(馬入川 | I) | |
| | [原水の種 表流水(自 | | | | [原水の種 ダム直接 | 類] | | | [原水の種 ダム放流 | 類] | | |
| | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 166, | 294 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 160,0 |)90 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 529,5 | 582 (m³) |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2 - ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 12 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 12 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1 — トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | -1.3 | -1.5 | -1.4 | 4 | -1.0 | -1.5 | -1.2 | 4 | -0.9 | -1.4 | -1.2 | 4 |
| 従属栄養細菌 | <1 | <1 | <1 | 4 | <1 | <1 | <1 | 4 | 3 | <1 | 2 | 4 |
| 1,1 — ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 27.4 | 9.2 | 17.8 | 12 | 27.8 | 10.3 | 19.4 | 12 | 28.0 | 9.8 | 18.5 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生りン (1) (砂イナン) | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメダン生成能 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | 事業主体 | :夕] | | | 事業主体 | :夕] | | | 事業主体 | 夕] | | |
|--|----------------|---------------|-----------|----------|----------------|-----------|-----------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| | | | K 11118 | | | | ★ 1111 目 | | | | шв | |
| | 14 - 00 | J2 作第 | 泉川祭 | | 14 - 0 | 02 作 | 奈川県 | | 14 - 00 |)2 神奈 | 川県 | |
| | 横須賀市 | | | | 横須賀市 | | | | 横須賀市 | | | |
| | [浄水場名 |] 01 - | 00 | | [浄水場名 |] 03 - | 00 | | [浄水場名 |] 04 - | 00 | |
| | 走水水源: | 地 | | | 有馬浄水: | 場 | | | 小雀浄水 | 易 | | |
| 検査項目 | [水源名] 横須賀市: | 走水 | | | [水源名] 相模川水 | 系相模川 | | | [水源名] 相模川水 | 系(馬入川 | I) | |
| | [原水の種 湧水 | 類] | | | [原水の種 表流水(自 | | | | [原水の種類 ダム放流 | 類] | | |
| | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | | 772 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 32,5 | 525 (m³) | [1日平均活 | 争水量] | 529,5 | i82 (m³) |
| | 最高 | 最高 最低 平均 回数 量 | | | | | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ウラン及びその化合物 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ニッケル及びその化合物 | <0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 4 | <0.001 | < 0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 1,2 — ジクロロエタン | <0.0001 | < 0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | < 0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| トルエン | <0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 4 | <0.001 | < 0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜塩素酸 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4 |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 |
| 抱水クロラール | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 4 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.008 | <0.002 | 0.005 | 4 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 13 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 13 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 14 |
| 遊離炭酸 | 2.6 | 1.7 | 2.3 | 4 | 3.1 | 2.3 | 2.7 | 4 | 3.4 | 2.2 | 2.8 | 4 |
| 1,1,1ートリクロロエタン | <0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 4 | <0.001 | < 0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 4 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 4 |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | -0.8 | -1.2 | -1.0 | 4 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | 4 | -0.9 | -1.2 | -1.1 | 4 |
| 従属栄養細菌 | 20 | <1 | 5 | 12 | 7 | <1 | 1 | 12 | 8 | <1 | 2 | 12 |
| 1,1 — ジクロロエチレン | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 4 | <0.000005 | <0.000005 | <0.00005 | 4 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 4 |
| 水温(℃) | 27.3 | 11.3 | 19.6 | 13 | 27.1 | 10.8 | 19.2 | 13 | 27.3 | 10.4 | 19.9 | 14 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | 0.044 | 0.002 | 0.024 | 4 | 0.027 | 0.009 | 0.019 | 4 | 0.046 | 0.018 | 0.036 | 4 |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | 52.0 | 45.0 | 49.0 | 4 | 53.0 | 47.0 | 50.0 | 4 | 50.0 | 40.0 | 46.0 | 4 |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | 21.0 | 18.0 | 20.0 | 4 | 18.0 | 14.0 | 16.0 | 4 | 20.0 | 17.0 | 19.0 | 4 |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 持た | | [事業主体 14 - 00 川崎市 | | 奈川県 | | [事業主体 14 - 00 松田町 | | 奈川県 | | [事業主体 14 - 00 松田町 | | 川県 | |
|---|------------------|-------------------------|---------|---------|----------|-------------------------|------|-----|------|-------------------------|------|-----|----------|
| 旧様川水系(相模湖) | | | - | 00 | | | - | 01 | | | - | 02 | |
| 労人放流 浄水受水 浄水受水 浄水受水 (所) [1日平均浄水量] (1,405 (m)) 検示栓水 (所) (日平均浄水量] 1,405 (m) 検示検水 (のの) (のの) (のの) (のの) (のの) (のの) (のの) (のの) | 検査項目 | | 系(相模為 | 月) | | | | | | | | | |
| 給水栓水 一根水柱水 一根水柱 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | | | 類] | | | 1 | 類] | | | | 類] | | |
| アグチン及びその化合物 | | 1 | 争水量] | 254, | 017 (mื) | 1 | 争水量] | | (m³) | 1 | 争水量] | 1,4 | 405 (m³) |
| アンチェルアでの社会物 (0.0001 (0.0001 4 | | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| コープリルロエタン | アンチモン及びその化合物 | | | | | | | - | | | | - | |
| 12—ジウロロエタン | ウラン及びその化合物 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | | | | | | | | |
| PLLY | ニッケル及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | İ | | | | | | | |
| 次別能が(2-エチルヘキシル) | 1,2 — ジクロロエタン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | | | | | | | | |
| 垂曳表験 (0.01 〈0.01 〈0.01 〈0.01 〈4 〈 | トルエン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| 三酸化塩素 9/10口でヒードリル 0.001 (0.001 4 4 8 8 8 8 8 8 9 9/10口でヒードリル 0.003 0.001 0.002 4 8 8 8 8 9 9/10口でヒードリル 0.003 0.001 0.002 4 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニリル 0.001 <0.001 | 亜塩素酸 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | | | | | | | |
| 扱水クロラール | 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 機業類 | | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 0.5 0.4 0.5 12 0.4 0.2 0.3 12 0.3 0.1 0.2 12 過離接酸 6.2 2.2 4.7 4 4 1 1.11ードリウロロエタン (0.001 (0.001) 4 4 1 1.11ードリウロエラン (0.001) (0.001) 4 4 1 1 1.11ードリウロエラン (0.001) (0.001) 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 4 | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 6.2 2.2 4.7 4 4 6 6 6 7 1.1.1-リソロロエタン | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 - トリクロロエタン | | | | | | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 |
| メチルーセーブチルエーテル (MTBE) | | _ | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | _ | | | | | | | | | | | |
| 果気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) -1.1 -1.6 -1.3 4 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) -1.1 -1.6 -1.3 4 (| | | | | | | | | | | | | |
| 佐属栄養細菌 | | | | 4.0 | | | | | | | | | |
| 1.1ージウロロエチレン | | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物((/ml)) アルカリ度 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | | |
| 水温(°C) 28.6 10.3 19.6 12 | | (0.0001 | ⟨0.0001 | ₹0.0001 | 4 | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 (生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (セック) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) (セック) 浮遊物質(SS) (セック) 侵食性遊離炭酸 (セック) 全窒素 (セック) リン酸イオン (セック) トリハロメタン生成能 (セック) 生物 (n/ml) (ロッカリ) アルカリ度 (ロッカリ) 溶存酸素 (ロッカリ) | | 20.6 | 10.2 | 10.6 | 10 | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) (化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (大学のでは、100mmでは、1 | | 20.0 | 10.3 | 19.0 | 12 | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全野 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) 食食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン リノルメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 () | | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リク リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 クリン タリン クリン リン酸イオン クリハロメタン生成能 生物 (n/ml) クリルカリ度 溶存酸素 クリカリウ 溶存酸素 クリカリウ | | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | 全リン | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 | リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 溶存酸素 | トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン 16.0 9.5 13.0 12 | | | | | | | | | | | | | |
| | 硫酸イオン | 16.0 | 9.5 | 13.0 | 12 | | | | | | | | |

| | [事業主体 14 - 0 松田町 | | 泉川県 | | [事業主体 14 - 0 真鶴町 | | 奈川県 | | [事業主体 14 - 00 真鶴町 | | 川県 | |
|--|------------------------|-----|----------|----------|------------------------|--------|------|----------|-------------------------|------|------|----------|
| | [浄水場名 中河原配 | | 03 | | [浄水場名 | _ | | | [浄水場名 | _ | 00 | |
| 検査項目 | [水源名] 中河原水 | 源 | | | [水源名] 江之浦水 | 源(岩1•뉢 | 旹2) | | [水源名] 湯河原町 | より受水 | | |
| | [原水の種 浄水受水 | | | | [原水の種 湧水・深ま | | | | [原水の種 浄水受水 | 類] | | |
| | [1日平均; 給水栓水 | | 1, | 630 (m³) | [1日平均] 給水栓水 | 争水量] | 1,9 | 913 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 7 | '62 (m³) |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <u> </u> | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2 — ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1 — トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| (人) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 ー ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| へルブルオロオクタンズルボン酸(PFOS)及びペルブルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) | | | | | 25.2 | 12.7 | 19.2 | 12 | 27.0 | 13.0 | 19.4 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | 25.2 | 12.7 | 18.2 | 12 | 27.0 | 13.0 | 13.4 | 12 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| | [事業主体 | (名) | | | 事業主体 | (名) | | | [事業主体 | 太名] | | |
|--|----------------|--------|--------|----------|---------------|---------|---------|----------|---------------|------------------|-------------|--------|
| | 14 - 00 | | 泉川県 | | 14 - 0 | | 奈川県 | | | ,口。)07 神务 | S I I I I I | |
| | | JU 1世元 | ト川宗 | | | U/ 1世 = | 示川宗 | | 1 | | ・川宗 | |
| | 真鶴町 | | | | 小田原市 | | | | 小田原市 | Ī | | |
| | [浄水場名 |] 03 - | 00 | | [浄水場名 |] 01 - | 00 | | [浄水場4 | 占] 02 - | - 00 | |
| | 棚子下送 | 水ポンプ場 | i Ī | | 第二水源: | 地 | | | 第三水源 | i地 | | |
| 検査項目 | [水源名] | | | | [水源名] | | | | [水源名] | | | |
| KEKI | 棚子下水 | 源 | | | 第二水源: | 地 | | | 第三水源 | | | |
| | [原水の種 深井戸水 | 類] | | | [原水の種 深井戸水 | 類] | | | [原水の種 深井戸水 | | | |
| | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | | 180 (m³) | [1日平均》 | 争水量] | 6,8 | 875 (m³) | [1日平均 休止中 | 浄水量] | | 0 (m³) |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | <0.0020 | 1 | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2 — ジクロロエタン | | | | | | | <0.0004 | 1 | | | | |
| トルエン | | | | | | | <0.040 | 1 | | | | |
| フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) | | | | | | | <0.008 | 1 | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | <0.001 | 1 | İ | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | <0.002 | 1 | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 366 | | | | |
| 遊離炭酸 | 1 | | | | | | 2.0 | 1 | | | | |
| 1,1,1ートリクロロエタン | | | | | | | <0.030 | 1 | | | | |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | <0.002 | 1 | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | \0.002 | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | <1 | 1 | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | -0.4 | -0.8 | -0.5 | 8 | | | | - |
| | | | | | -0.4 | -0.6 | | | | | | |
| 従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン | | | | | | | <0.0100 | 1 | | | | - |
| I,I ー ングロロエテレン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | + | | | | | | \0.0100 | | | | | |
| | | | | | 00.0 | 140 | 10.0 | 10 | 1 | | | - |
| 水温(℃) | | | | | 22.0 | 14.2 | 18.0 | 12 | - | | | - |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | - |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | - |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | 65.0 | 60.0 | 62.3 | 8 | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | ļ | | | |
| 硫酸イオン | | | | | 11.7 | 10.3 | 11.1 | 8 | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| | 事業主体 | -夕1 | | | 事業主体 | -夕1 | | | 事業主体 | ·夕1 | | |
|--|---------------|---------|-------------|----------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|--------|---------|---------|
| | | | | | | | - | | | | | |
| | 14 - 00 | U/ 仲分 | 条川県 | | 14 - 0 | U/ 仲分 | 泉川祭 | | 14 - 00 | J/ 仲宗 | 川県 | |
| | 小田原市 | | | | 小田原市 | | | | 小田原市 | | | |
| | [浄水場名 | i] 03 - | 00 | | [浄水場名 | i] 04 - | 00 | | [浄水場名 |] 05 - | 00 | |
| | 高田浄水 | 場 | | | 石橋配水 | 池 | | | 米神配水 | 池 | | |
| 検査項目 | [水源名] 酒匂川 | | | | [水源名] 石橋水源: | 地 | | | [水源名] 米神水源: | 地 | | |
| | [原水の種 ダム放流 | 類] | | | [原水の種 深井戸水 | | | | [原水の種 深井戸水 | 類] | | |
| | [1日平均》 | 争水量] | 54,6 | 621 (m³) | [1日平均》 | 争水量] | | 64 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | | 77 (m³) |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2 — ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| トルエン | | | <0.040 | 1 | | | <0.040 | 1 | | | <0.040 | 1 |
| フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 366 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 366 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 366 |
| 遊離炭酸 | | | 2.0 | 1 | | | <2.0 | 1 | | | <2.0 | 1 |
| 1,1,1 ー トリクロロエタン | | | <0.030 | 1 | | | <0.030 | 1 | | | <0.030 | 1 |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | -0.5 | -1.1 | -0.8 | 8 | -0.9 | -1.3 | -1.1 | 8 | -0.8 | -1.1 | -1.0 | 8 |
| 従属栄養細菌 | | | 5 | 1 | | | 1 | 1 | | | 6 | 1 |
| 1,1 — ジクロロエチレン | | | <0.0100 | 1 | | | <0.0100 | 1 | | | <0.0100 | 1 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 28.2 | 11.8 | 20.2 | 12 | 27.1 | 8.8 | 20.0 | 12 | 28.2 | 10.0 | 19.7 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | 64.0 | 47.5 | 57.6 | 8 | 31.5 | 29.5 | 30.6 | 8 | 34.5 | 32.0 | 33.4 | 8 |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | 12.1 | 9.3 | 11.1 | 8 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 8 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 8 |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| | [事業主体 | :名] | | | [事業主体 | :名] | | | [事業主体 | :名] | | |
|--|----------------|---------------------|---------|---------|----------------|--------|-----------|----------|----------------|----------|---------|----------|
| | 14 - 00 | | 奈川県 | | 14 - 00 | | 奈川県 | | 14 - 00 | | 1110旦 | |
| | |) 1 1 72 | スハス | | | U/ 147 | אל ויל אל | | | 77 TT 75 | ארויזג | |
| | 小田原市 | | | | 小田原市 | | | | 小田原市 | | | |
| | [浄水場名 |] 06 - | 00 | | [浄水場名 |] 07 - | 00 | | [浄水場名 |] 08 - | 00 | |
| | 根府川第· | _ | | | 根府川第 | - | | | 江之浦配 | - | | |
| 検査項目 | [水源名] | | | | [水源名] | | | | [水源名] | | | |
| 快重填口 | 根府川第· | 一水源地 | | | 根府川第二 | 二水源地 | | | 根府川第 | 三水源地 | | |
| | [原水の種 湧水 | 類] | | | [原水の種 湧水 | 類] | | | [原水の種 深井戸水 | 類] | | |
| | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | ; | 346 (㎡) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 3 | 351 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 2 | 97 (m³) |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2 - ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| トルエン | | | <0.040 | 1 | | | <0.040 | 1 | | | <0.040 | 1 |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 366 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 366 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 366 |
| 遊離炭酸 | | | <2.0 | 1 | 1 | | 4.0 | 1 | 1 | | <2.0 | 1 |
| 1.1.1ートリクロロエタン | | | <0.030 | 1 | | | <0.030 | 1 | | | <0.030 | 1 |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | ₹0.002 | | | | ₹0.002 | | | | (0.002 | <u> </u> |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | -1.3 | -1.5 | -1.4 | 8 | -1.3 | -1.5 | -1.4 | 8 | -1.3 | -1.5 | -1.4 | 8 |
| 従属栄養細菌 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.0 | 8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 6 | 1 |
| 1,1 - ジクロロエチレン | | | <0.0100 | 1 | | | <0.0100 | 1 | | | <0.0100 | 1 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | ₹0.0100 | ' | | | \0.0100 | ı | | | \0.0100 | <u>'</u> |
| 水温(°C) | 24.0 | 12.3 | 18.0 | 12 | 20.2 | 12.3 | 15.9 | 12 | 27.6 | 12.5 | 18.1 | 12 |
| アンモニア態窒素 | 24.0 | 12.3 | 10.0 | 12 | 20.2 | 12.3 | 10.9 | 12 | 27.0 | 12.5 | 10.1 | 12 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| ポートの政策を水重(OOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 深が物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | 32.0 | 27.5 | 29.1 | 8 | 41.0 | 35.0 | 37.8 | 8 | 41.0 | 35.0 | 37.8 | 8 |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | - | | |
| 硫酸イオン | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 8 | 3.0 | 2.1 | 2.6 | 8 | 3.0 | 2.2 | 2.6 | 8 |
| 溶性ケイ酸 | | | | | 5.0 | | | | 5.0 | | | |

| | 事業主体 | ·夕1 | | | 事業主体 | ·夕1 | | | 事業主体 | 夕1 | | |
|--|----------------|---------------------|-----------|----------|----------------|-----------|-----------|----------|----------------|---------|-----------|---------|
| | | | K 11118 | | | | ᄼᆒ | | [| | шв | |
| | 14 - 00 | J8 作第 | 条川県 | | 14 - 0 | 08 作 | 奈川県 | | 14 - 00 |)8 神奈 | 川県 | |
| | 神奈川県 | | | | 神奈川県 | | | | 神奈川県 | | | |
| | [浄水場名 |] 01 - | 00 | | [浄水場名 |] 02 - | - 00 | | [浄水場名 |] 03 - | 00 | |
| | 寒川浄水: | 場 | | | 谷ケ原浄ス | 火場 | | | 落合浄水 | 易 | | |
| 検査項目 | [水源名] | | | | [水源名] | | | | [水源名] | | | |
| | 相模川水 | 系相模川 | | | 相模川水 | 系相模貯 | 水池 | | 相模川水 | 系支流栃 | 谷川 | |
| | 1 | 原水の種類] [原表流水(自流) ダル | | | | | | | [原水の種 表流水(自 | | | |
| | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 291, | 581 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 124,5 | 578 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 1,1 | 06 (m³) |
| | 最高 | 最高 最低 平均 回数 最 | | | | | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| ウラン及びその化合物 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ニッケル及びその化合物 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 1,2 — ジクロロエタン | <0.0001 | < 0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | < 0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| トルエン | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | <0.001 | 1 |
| 亜塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 抱水クロラール | 0.007 | 0.002 | 0.005 | 4 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 農薬類 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | | <0.01 | 1 |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 12 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 12 |
| 遊離炭酸 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 4 | 2.9 | 1.2 | 1.8 | 4 | | | 1.9 | 1 |
| 1,1,1ートリクロロエタン | <0.001 | < 0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | < 0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | < 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | <1 | <1 | <1 | 12 | <1 | <1 | <1 | 12 | <1 | <1 | <1 | 12 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | -0.8 | -1.3 | -1.1 | 4 | -0.8 | -1.2 | -1.0 | 4 | | | -1.3 | 1 |
| 従属栄養細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 1,1 — ジクロロエチレン | <0.0001 | < 0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | < 0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 4 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 4 | | | <0.000005 | 1 |
| 水温(℃) | 30.0 | 10.0 | 19.9 | 12 | 28.0 | 9.4 | 17.9 | 12 | 26.9 | 8.2 | 17.2 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | 52.0 | 48.0 | 50.0 | 4 | 50.0 | 44.0 | 48.0 | 4 | | | 30.0 | 1 |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | 19.0 | 16.0 | 17.0 | 4 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 4 | 26.0 | 17.0 | 22.0 | 4 |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| | 「 古 ** | · # 1 | | | r = ** + /+ | . # 1 | | | r击 ** → /+ | . | | |
|---|---|---------------|------------|----------|------------------------|---------|-----------|----------|----------------|-----------|-----------|---------|
| | [事業主体 | | | | [事業主体 | | <i></i> | | [事業主体 | | | |
| | 14 - 00 | 08 神 | 奈川県 | | 14 - 00 | 08 神 | 奈川県 | | 14 - 00 |)8 神奈 | 川県 | |
| | 神奈川県 | | | | 神奈川県 | | | | 神奈川県 | | | |
| | [浄水場名 |] 04 - | - 00 | | [浄水場名 |] 05 - | - 00 | | [浄水場名 |] 07 - | 00 | |
| | 鎌沢浄水 | 場 | | | 大山浄水 | 場 | | | 和田浄水 | 場 | | |
| 検査項目 | [水源名] 相模川水 | 系支流佐 | 野川 | | [水源名] 花水川支流 | 流大山川 | | | [水源名] 相模川水 | 系支流沢 | 井川 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | [原水の種 表流水(自 | | | | [原水の種 表流水(自 | | | | [原水の種 表流水(自 | | | |
| | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | | 328 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 2 | 201 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 1 | 68 (m³) |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| ウラン及びその化合物 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ニッケル及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 1,2 — ジクロロエタン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| トルエン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 亜塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 抱水クロラール | 0.002 | <0.001 | 0.002 | 4 | 0.003 | <0.001 | 0.002 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 農薬類 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 12 |
| 遊離炭酸 | (0.004 | (0.004 | 1.0 | 1 | (0.004 | (0.004 | 0.8 | 1 | (0.004 | (0.004 | 1.4 | 1 |
| 1,1,1 — トリクロロエタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | /1 | /1 | /1 | 10 | (1 | /1 | /1 | 10 | <1 | /1 | /1 | 10 |
| 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) | <1 | <1 | <1 -0.9 | 12 | <1 | <1 | <1 | 12 | (1 | <1 | <1 | 12 |
| 隣長性(フノケリア指数) 従属栄養細菌 | 2 | 0 | -0.9 | 1 | 4 | 0 | -1.0 1 | 12 | 2 | 0 | -1.5 0 | 12 |
| 1,1 - ジクロロエチレン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 12 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| 「, 「 一 プンロロエ J レン ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | \0.0001 | \0.0001 | <0.00001 | 1 | ₹0.0001 | \0.0001 | <0.0001 | 1 | \0.0001 | \0.0001 | <0.00001 | 1 |
| 水温(°C) | 26.5 | 9.9 | 17.5 | 12 | 22.6 | 7.3 | 15.0 | 12 | 24.6 | 7.0 | 15.3 | 12 |
| アンモニア態窒素 | 20.0 | 3.3 | 17.5 | 12 | 22.0 | 7.0 | 10.0 | 12 | 24.0 | 7.0 | 10.0 | 12 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | İ | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | 32.0 | 1 | | | 33.0 | 1 | | | 27.0 | 1 |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | 9.0 | 9.0 7.0 8.0 4 | | | | | 5.5 | 4 | 8.0 | 6.0 | 7.3 | 4 |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| | 事業主体 | | / | | [事業主体 | | * 1111 | | [事業主体 | | | |
|--|----------------------------|---------------|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------|-----------------------|-------|-------|------|
| | 14 - 00 神奈川県 |)8 作第 | 奈川県 | | 14 - (神奈川県 | | 奈川県 | | 14 - 00 三浦市 | J9 | 川県 | |
| | [浄水場名 鳥屋浄水 ⁵ | _ | - 00 | | [浄水場名 長野浄水 | 名] 09 · 〈場 | - 00 | | [浄水場名 ずい道配力 | _ | 00 | |
| 検査項目 | [水源名] 相模川水 | 系支流早 | 戸川 | | [水源名] 相模川水 | 《系支流西 | ī沢 | | [水源名] 横須賀浄 水系)、 | 水受水(津 | ≛久井水系 | 、武山 |
| | [原水の種 伏流水 | 類] | | | [原水の種 伏流水 | 重類] | | | [原水の種 浄水受水 | 類] | | |
| | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 2, | 581 (m³) | [1日平均 休止中 | 浄水量] | | 0 (m³) | [1日平均》 | 争水量] | | (m³) |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | <0.0003 | 最高 最低 平均 回数 1 | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| 1,2 — ジクロロエタン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | | | | | | | | |
| トルエン | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | - | | | | | | | |
| 抱水クロラール | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | - | | | | | | | |
| 農薬類 | 0.5 | 0.4 | <0.01 | 1 | | | | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 070 |
| 残留塩素 遊離炭酸 | 0.5 | 0.4 | 0.5 1.8 | 12 | | | | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 378 |
| 1,1,1 ー トリクロロエタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | (0.001 | \0.001 | (0.001 | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | <1 | <1 | <1 | 12 | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | -1.6 | 1 | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | 1 | 0 | 0 | 12 | | | | | | | | |
| 1,1 ー ジクロロエチレン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | 1 | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | <0.00005 | 1 | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 24.9 | 8.7 | 16.9 | 12 | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | 27.0 | 1 | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | 27.0 | <u>'</u> | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4 | 1 | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| | [事業主体 | (名) | | | [事業主体 | (名) | | | [事業主体 | (名) | | |
|---|-----------------------|---------|---------------|------|------------------------|--------|---------------|------|----------------|-------|-------|------|
| | 14 - 00 | | 泉川県 | | 14 - 0 | | 奈川県 | | 14 - 0 | | :1111 | |
| | | U3 147. | トハス | | | ሀን ተሞን | ҡиҡ | | 1 | 00 作示 | ハホ | |
| | 三浦市 | | | | 三浦市 | | | | 三浦市 | | | |
| | [浄水場名 | | 00 | | [浄水場名 | _ | 00 | | [浄水場名 松輪配水 | | 00 | |
| 検査項目 | [水源名] 横須賀浄 水系)、 | 水受水(津 | 津久 井水系 | 系、武山 | [水源名] 横須賀浄: 水系)、 | 水受水(津 | 津 久井水系 | 、武山 | [水源名] 横須賀浄 | 水受水(津 | ≌久井水系 | .) |
| | [原水の種 浄水受水 | | | | [原水の種 浄水受水 | 類] | | | [原水の種 浄水受水 | 類] | | |
| | [1日平均;給水栓水 | | | (m³) | [1日平均] 給水栓水 | 争水量] | | (m³) | [1日平均; 給水栓水 | 争水量] | | (m³) |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2 - ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 378 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 378 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 378 |
| 遊離炭酸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 070 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 070 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 070 |
| 1,1,1ートリクロロエタン | | | | | | | | | 1 | | | |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 - ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| 「, 「 一 ンソロロエアレノ ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) | + | | | | + | | | | | | | |
| 水温(°C) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | 1 | | | | | | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生りン しいませんさい | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | 1 | | | |

| | [事業主体 | (名) | | | 事業主体 | (名) | | | [事業主体 | (名) | | |
|--|----------------|------|-----|----------|----------------|------|-------|----------|----------------|------|-------|----------|
| | 14 - 0 | | 別県 | | 14 - 0 | | 소!!!॥ | | 14 - 0 | | :1111 | |
| | | | スハル | | | | ҡ끼ҡ | | 1 | | :川木 | |
| | 湯河原町 | (古洪) | | | 湯河原町 | (古洪) | | | 湯河原町 | (古洪) | | |
| | [浄水場名 幕山浄水 | | 00 | | [浄水場名 南郷浄水: | | 01 | | [浄水場名 尾崎浄水 | - | 02 | |
| 検査項目 | [水源名] 新崎川表 | 流水 | | | [水源名] 湧水 | | | | [水源名] 湧水 | | | |
| | [原水の種 表流水(自 | | | | [原水の種 湧水 | 類] | | | [原水の種 湧水 | 類] | | |
| | [1日平均;給水栓水 | 争水量] | 5, | 501 (m³) | [1日平均》 | 争水量] | 1,0 | 691 (m³) | [1日平均; 給水栓水 | | 1,0 | 054 (m³) |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2 — ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 12 |
| 1,1,1ートリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(週マンガン酸ガゲ)な消貨量/ 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| (人民栄養細菌) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 ー ジクロロエチレン | + | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| | 事業主体 | (名) | | | [事業主体 | (名) | | | [事業主体 | (名) | | |
|--|----------------|------|-----|----------|----------------|------|-------|----------|-------------------------|------------|--------|----------|
| | 14 - 0 | | 泉川県 | | 14 - 0 | | 左 但 | | 14 - 0 | | :1110旦 | |
| | | | トハホ | | | | ホハホ | | 1 | | 까지 | |
| | 湯河原町 | (古浜) | | | 湯河原町 | (古浜) | | | 湯河原町 | (湯川県) | | |
| | [浄水場名 城堀第1酉 | - | 03 | | [浄水場名 城堀第1酉 | - | 04 | | [浄水場名 広河原浄 | | 00 | |
| 検査項目 | [水源名] 湧水 | | | | [水源名] 深井戸 | | | | 「水源名」 「水源名」 アケジ沢表 | ē流水 | | |
| | [原水の種 湧水 | 類] | | | [原水の種 深井戸水 | | | | [原水の種 表流水(自 | | | |
| | [1日平均; 給水栓水 | | | 340 (m³) | [1日平均] | | į | 570 (m³) | [1日平均] | | 5,5 | 547 (m³) |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2 - ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | 1 | | | | İ | | | | İ | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | i | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 12 |
| 1,1,1ートリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | 1 | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | 1 | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1ージクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(°C) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| | Г лк э. д | - 57 | | | r _+ 444 -> 74 | - 57 | | | r =+ | - 51 | | |
|--|-----------------------|----------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|----------|----------------------------|----------|----------|---------|
| | [事業主体 | | | | [事業主体 | | | | [事業主体 | | | |
| | 14 - 0 | 12 神 | 奈川県 | | 14 - 0 | 12 神 | 奈川県 | | 14 - 0 | 12 神奈 | 川県 | |
| | 座間市 | | | | 座間市 | | | | 座間市 | | | |
| | [浄水場名 第1配水均 | - | - 00 | | [浄水場名 第2配水場 | - | 00 | | [浄水場名 相模が丘 | - | 01 | |
| | 第186小 | 勿 | | | 第4部小 | 勿 | | | 作用状が吐息 | 北小场 | | |
| 検査項目 | [水源名] 第1水源(| 他6水源 | と混合) | | [水源名] 第2水源(| 他3水源 | と混合) | | [水源名] 深井戸7 5 | 号井(他1; | 水源と混合 |) |
| | [原水の種 浅井戸水 | | k•浄水受 | 水 | [原水の種 浅井戸水 | | k | | [原水の種 深井戸水 | | < | |
| | [1日平均] | | 18, | 827 (m³) | [1日平均] 給水栓水 | 争水量] | 9,3 | 385 (m³) | [1日平均] 給水栓水 | 争水量] | 8,0 | 70 (m³) |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 1,2 — ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| トルエン | | | <0.040 | 1 | | | <0.040 | 1 | | | <0.040 | 1 |
| フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | 21.0 | 1 | | | 17.0 | 1 | | | 12.0 | 1 |
| 1,1,1 — トリクロロエタン | | | <0.030 | 1 | | | <0.030 | 1 | | | <0.030 | 1 |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 0.4 | 1 | | | 0.6 | 1 | | | 0.6 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | -1.1 | 1 | | | -1.0 | 1 | | | -1.1 | 1 |
| 従属栄養細菌 | 8 | 2 | 5 | 4 | 200 | 0 | 51 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 |
| 1,1 ー ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.000034 | 0.000013 | <0.0100 | 1 | 0.000000 | 0.000012 | <0.0100 | 1 | 0.000013 | 0.000005 | <0.0100 | 1 |
| | | | 0.000018 | 4 | 0.000020 | 0.000013 | 0.000016 | 4 | | 0.000005 | 0.000007 | 4 |
| 水温(℃) アンモニア態窒素 | 26.5 | 12.8 | 18.8 | 12 | 29.2 | 13.0 | 19.3 | 12 | 25.5 | 12.0 | 17.9 | 12 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| | [事業主体 14 - 01 神奈川県 | 15 神刻 | 奈川県 | | [事業主体 14 - 0 神奈川県 | 15 神 | 奈川県 | | [事業主体 14 - 01 神奈川県(| 5 神奈 | 川県 | |
|---|--------------------------|---------|-----------|----------|-------------------------|---------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|
| | [浄水場名 下湯配水 | | 00 | | [浄水場名 イタリー浄ス | _ | 00 | | [浄水場名 品ノ木浄水 | _ | 00 | |
| 検査項目 | [水源名] 水土野水 | 源 | | | [水源名] イタリー水源 | 亰 | | | [水源名] 品ノ木水源 | Ā | | |
| | [原水の種 湧水 | 類] | | | [原水の種 湧水 | 類] | | | [原水の種 湧水 | 類] | | |
| | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 4, | 288 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 1,9 | 956 (m³) | [1日平均汽 給水栓水 | 争水量] | 1,9 | 951 (m³) |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| ウラン及びその化合物 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ニッケル及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 1,2 — ジクロロエタン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| トルエン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 亜塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 抱水クロラール | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 農薬類 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 | | | <0.01 | 1 |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | (0.001 | (0.001 | 5.6 | 1 | (0.001 | (0.001 | 8.3 | 1 | (0.001 | (0.001 | 1.1 | 1 |
| 1,1,1ートリクロロエタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 臭気強度(TON) | <1 | <1 | <1 | 12 | <1 | <1 | <1 | 12 | <1 | <1 | <1 | 12 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | ×1 | -0.6 | 1 | | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | -1.6 | 1 | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \(\frac{1}{2}\) | -0.6 | 1 |
| (龙属栄養細菌 | 25 | 2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 1.0 | 12 | 22 | 2 | 8 | 12 |
| 1,1 - ジクロロエチレン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | <0.000005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.000005 | 1 |
| 水温(℃) | 24.0 | 13.0 | 18.5 | 12 | 20.5 | 12.4 | 15.9 | 12 | 20.0 | 9.0 | 14.9 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン パート イナン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | 70.0 | | | | 27.0 | 4 | | | 40.0 | |
| アルカリ度 | | | 79.0 | 1 | | | 37.0 | 1 | | | 49.0 | 1 |
| 溶存酸素 硫酸イオン | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 4 | 82.0 | 30.0 | 61.0 | 4 | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 4 |
| 対策 対策 対策 対策 対策 対策 対策 対策 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 4 | 82.0 | 30.0 | 01.0 | 4 | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 4 |

| | [事業主体 14 - 0 南足柄市 | 16 神系 | 県川県 | | [事業主体 14 - 0 南足柄市 | 16 神系 | 奈川県 | | [事業主体 14 - 0 ⁻ 山北町 | 19 神奈 | | |
|--|-------------------------|-------|------|----------|-------------------------|-------|------|----------|-------------------------------------|-------|------|----------|
| | [浄水場名 矢倉沢浄: | - | 00 | | [浄水場名 岩原浄水 | - | 00 | | [浄水場名 山北上水 | - | | |
| 検査項目 | [水源名] 酒匂川水 | 系狩川 | | | [水源名] 岩原水源 | | | | [水源名] 皆瀬川 | | | |
| | [原水の種 表流水(自 | | | | [原水の種 深井戸水 | 類] | | | [原水の種 伏流水・表 | | 流) | |
| | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 10, | 118 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 3,5 | 541 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 2,7 | 788 (m³) |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2 — ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1 ー トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 - ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 23.2 | 11.1 | 17.0 | 12 | 25.6 | 11.0 | 18.4 | 12 | 23.8 | 10.1 | 16.8 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| | [事業主体 | | 奈川県 | | [事業主体 | | 奈川県 | | [事業主体 | | ·川県 | |
|--|---------------|------------------|---------|------|----------------|------|------|---------|----------------|------|------|----------|
| | 山北町 | | | | 山北町 | 117 | | | 山北町 | 1172 | | |
| | [浄水場4 山北上水 | 名] 02 - :道(台) | - 00 | | [浄水場名 | | 00 | | [浄水場名 山北上水 | _ | | |
| 検査項目 | [水源名] 栃谷沢 | | | | [水源名] 尺里川 | | | | [水源名] 前耕地井 | 戸 | | |
| | [原水の種 伏流水 | 種類] | | | [原水の種 湧水 | 類] | | | [原水の種 深井戸水 | 類] | | |
| | [1日平均休止中 | 浄水量] | | (m³) | [1日平均] 給水栓水 | 争水量] | | 80 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 1,3 | 317 (m³) |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2 — ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1ートリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| (後属栄養細菌) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 - ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | + | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | 22.7 | 11.0 | 16.2 | 12 | 20.0 | 9.0 | 17.0 | 12 |
| アンモニア熊窒素 | 1 | | | | | 11.5 | 10.2 | ,,2 | 20.0 | 0.0 | 17.3 | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体 14 - 0 山北町 [浄水場名 山北上水: | 19 神র i] 05 - | ≶川県 00 | | 細野浄水[水源名] | 020 神 名] 01 · [、] 場 | 奈川県 - 01 | | [事業主体 14 - 02 愛川町 [浄水場名 高峰浄水 [水源名] | 20 神奈 i] 02 - 場 | | |
|--|--|------------------|-----------|---------|------------------------|------------------------------------|-------------|--------|---|-----------------------|-----|---------|
| | 怒杭井戸 [原水の種 深井戸水 | | | | 南山水源 [原水の種 表流水() | 重類] | | | 滝の沢第 ⁻ [原水の種 湧水 | | | |
| | [1日平均》 | 争水量] | | 77 (m³) | [1日平均休止中 | 浄水量] | | 0 (m³) | [1日平均] 給水栓水 | | 1,! | 535 (㎡) |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | 1 | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2 — ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | İ | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12 | | | | | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | · · | | | | | | | | |
| 1.1.1ートリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 — ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 20.0 | 9.0 | 17.0 | 12 | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 給水栓水 給水栓水 給水栓水 給水栓水 給水栓水 粉水栓水 水栓 粉水栓水 粉水栓水 粉水栓水 粉水栓水 粉水栓 | | [事業主体 14 - 03 愛川町 | | 条川県 | | [事業主体 14 - 0 愛川町 | | 奈川県 | | [事業主体 14 - 0 愛川町 | [[] 名] 20 神奈 | 川県 | |
|--|---------------------|-------------------------|-------|-----|----------|------------------------|-----|------|----------|------------------------|--------------------------|-----|---------|
| 塩川第1・2・3水源 | | | - | 01 | | | | - 01 | | | | 01 | |
| 接換水(自流)・浅井戸水 浅井戸水 1日平均浄水量 6,199 (| 検査項目 | 1 | 2•3水源 | | | | 2水源 | | | | 3•4水源 | | |
| 給水栓水 給水栓水 給水栓水 給水栓水 粉水栓水 粉水栓水 粉水栓水 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日 | | | | ‡戸水 | | 1 | | | | | | | |
| アジチン及びその化合物 コンプル及びその化合物 コンプルスプチの化合物 コンプルスプチの化合物 コンプルスプロエケン トルエン アタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 亜塩素酸 亜塩木酸 コ酸化塩素 ツクロロアドトドリル 松木クロラール 農薬類 機智塩素 0.4 0.3 0.4 12 0.5 0.3 0.4 12 0.5 0.3 0.4 11 0.5 0.3 0.4 12 | | 1 | | | 465 (m³) | 1 | | 2,3 | 388 (m³) | | | 6,1 | 99 (m³) |
| アンチン及びその化合物 フラン及びその化合物 12 - ジワロエウタ トルエン アシル酸が(2- エチルヘキジル) | | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| - ニップル及びその化合物 12 - ジウロロ15ク トルエン フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 亜塩素酸 - 酸化塩素 ジウロロアセトーリル 粉水クロラール 農薬類 ・ 機智塩素 - 0.4 0.3 0.4 12 0.5 0.3 0.4 12 0 | アンチモン及びその化合物 | 1 | | | | | | - | | | | - | |
| 1.2 - ジウロロエタン トルエン | ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| NULT | ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸シ(フェテルヘキシル) 単塩素酸 | 1,2 - ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| 要塩未酸 | トルエン | | | | | | | | | | | | |
| 三酸化塩素 ジウロロアセトトリル | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロアヤトニリル | 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール 農薬類 | 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 展業類 | ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 機能塩素 0.4 0.3 0.4 12 0.5 0.3 0.4 12 0.5 0.3 0.4 12 0.5 0.3 0.4 2 2 0.5 0.3 0.4 2 2 0.5 0.3 0.4 2 2 0.5 0.3 0.4 2 2 0.5 0.3 0.4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 遊離が酸 1.1.1ーリプロロエタン メチルー・ブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸か)ウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア精致) 従属栄養細菌 1.1ープDロロエチレン ベルフルオロオプタンスルル・海(PFOS)及びベルフルオロオプタン酸(PFOA) 水温 (**C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 保学的酸素要求量(GOD) 保学的酸素要求量(GOD) 保学的酸素要求量(GOD) 保学部度(SO) に受け遊離が酸 全窒素 生りン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 海脊酸素 (SO) (SO) (SO) (SO) (SO) (SO) (SO) (SO) | 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1ートリクロロエタン メチル・エーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (ランゲリア指数) (佐属学養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフルオロオクタンルルン酸(PFOS)及 びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(で) アンモニア態窒素 生物化学の酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮速物質(SS) 侵食性遊離皮酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 海存酸素 | 残留塩素 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| メチルーセーブチルエーテル (MTBE) 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度 (TON) 腐食性 (ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフルオロカアシスルネン酸(PFOS)及びペルフルオロカタン酸(PFOA) 水温 (**) 水温 (**) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(VV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 | 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージアロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(**CO) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(m/ml) アルカフ度 溶存酸素 | 1,1,1 — トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| 果気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1.1ージウロエチレン ベルフルはアロケッスルボー酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(*C) アンモエア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(/mi) アルカリ度 溶存酸素 | メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) 従属栄養細菌 1,1 ジワロロエチレン ベルフルオロオクタンスルボン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(*C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(SOmmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 1.1ージクロロエチレン ペルフルイロオウタンルホン療(PFOS)及びペルフルイロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 | 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1ージクロロエチレン ベルフルオロオウタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオウタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 | 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水温(°C) アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | | |
| 水温(°C) アンモア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 (生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) (大分の設定(50mmセル使用時) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) (大分の大力を) 浮遊物質(SS) (大分の大力を) 全窒素 (大力の大力を) キリンの設イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) (大力の) アルカリ度 (大力の) 溶存酸素 (大力の) | | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全野ン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全望末 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | | |
| 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | | |
| ドリハロメタン生成能 | | + | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 常存酸素 | | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | | | | | |
| T+TA /_\. | | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | | |

| | [事業主体 | ·夕1 | | | 事業主体 | ·夕1 | | | 事業主体 | ·夕1 | | |
|--|---------------|--------|-------------|----------|----------------|--------|-------------|----------|----------------|--------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | 1 | | | |
| | 14 - 02 | 23 神第 | 奈川県 | | 14 - 0 | 23 神 | 奈川県 | | 14 - 02 | 23 | 川県 | |
| | 秦野市 | | | | 秦野市 | | | | 秦野市 | | | |
| | [浄水場名 |] 04 - | - 00 | | [浄水場名 |] 07 - | 00 | | [浄水場名 |] 08 - | 00 | |
| | 船道取水 | 場 | | | 本町第8耳 | 以水場 | | | 本町第12 | :取水場 | | |
| 検査項目 | [水源名] 船道水源 | | | | [水源名] 本町第8月 | ×源 | | | [水源名] 本町第12 | 水源 | | |
| | [原水の種 深井戸水 | 類] | | | [原水の種 深井戸水 | 類] | | | [原水の種 深井戸水 | 類] | | |
| | [1日平均》 | 争水量] | | 985 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 1,2 | 273 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 1,2 | 65 (m³) |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 1,2 — ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| トルエン | | | <0.040 | 1 | | | <0.040 | 1 | | | <0.040 | 11_ |
| フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | 2.9 | 1 | | | 2.5 | 1 | | | 2.7 | 1 |
| 1,1,1ートリクロロエタン | | | <0.030 | 1 | | | <0.030 | 1 | | | <0.030 | 1 |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 0.6 | 1 | | | 1.2 | 1 | | | 0.3 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | -0.8 | 1 | | | -0.6 | 1 | | | -0.6 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | 0 | 1 | | | 10 | 1 | | | 2 | 1 |
| 1,1 ー ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | <0.0100 | 1 | | | <0.0100 | 1 | | | <0.0100 | 1 |
| | 100 | 400 | <0.000005 | 1 | 170 | 40.5 | <0.000005 | 1 | 400 | 450 | <0.000005 | 1 |
| 水温(℃) アンモニア態窒素 | 16.6 | 16.0 | 16.1 | 12 | 17.3 | 10.5 | 15.9 | 12 | 16.8 | 15.0 | 16.2 | 12 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| | r = * + + /+ | . / 7 | | | r 击 ** | . <i>t</i> r 1 | | | r击 ** | . | | |
|--|-------------------------|------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------|----------|----------------|-----------|-----------|---------|
| | [事業主体 | | | | [事業主体 | | | | [事業主体 | | | |
| | 14 - 02 | 23 神熱 | 奈川県 | | 14 - 0 | 23 神 | 奈川県 | | 14 - 02 | 23 神奈 | 川県 | |
| | 秦野市 | | | | 秦野市 | | | | 秦野市 | | | |
| | [浄水場名 本町第13 | - | - 00 | | [浄水場名 八幡山配: | _ | 01 | | [浄水場名 堀山下浄: | - | 01 | |
| 検査項目 | [水源名] 本町第13 | 水源 | | | [水源名] 秦野田水 | 源(他5水 | 源と混合) | | [水源名] 猿渡水源 | (他1水源 | と混合) | |
| | [原水の種 深井戸水 | 類] | | | [原水の種 浄水受水・ | | k•浅井戸 | 水 | [原水の種 表流水(自 | | 於 | |
| | [1日平均》 | 争水量] | 1,; | 361 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 6,9 | 914 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 2,6 | 99 (m³) |
| | 最高 | 最高 最低 平均 回数 量 | | | | | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 1,2 — ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| トルエン | | | <0.040 | 1 | | | <0.040 | 1 | | | <0.040 | 1 |
| フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | 2.1 | 1 | | | 2.7 | 1 | | | 2.3 | 1 |
| 1,1,1 — トリクロロエタン | | | <0.030 | 1 | | | <0.030 | 1 | | | <0.030 | 1 |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 0.5 | 1 | | | 0.9 | 1 | | | 0.3 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | -0.8 | 1 | | | -0.5 | 1 | | | -1.4 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | 0 | 1 | | | 0 | 1 | | | 0 | 1 |
| 1,1 — ジクロロエチレン | | | <0.0100 | 1 | | | <0.0100 | 1 | | | <0.0100 | 1 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 107 | 455 | <0.000005 | 1 | 05.0 | 400 | <0.000005 | 1 | | 0.0 | <0.000005 | 1 |
| 水温(℃) | 16.7 | 15.5 | 16.3 | 12 | 25.0 | 13.0 | 18.8 | 12 | 20.5 | 9.8 | 15.5 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 深が物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | 1 | | | | | | | |

| | [事業主体 | ·夕1 | | | 事業主体 | ·夕1 | | | 事業主体 | タ コ | | |
|--|----------------|--------|-----------|----------|----------------|--------|----------|----------|----------------|------------|----------|---------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | 14 - 02 | 23 神氣 | 奈川県 | | 14 - 0 | 23 神 | 奈川県 | | 14 - 02 | 23 神余 | 川県 | |
| | 秦野市 | | | | 秦野市 | | | | 秦野市 | | | |
| | [浄水場名 |] 13 - | - 01 | | [浄水場名 |] 14 - | 01 | | [浄水場名 | _ | 01 | |
| | 広畑配水 | 場 | | | 金井場配 | 水場 | | | 千村配水 | 易 | | |
| 検査項目 | [水源名] 岩井戸水 | 源(他1水 | (源と混合) | | [水源名] 芹沢水源 | | | | [水源名] 沼代水源 | 〔他2水源 | と混合) | |
| | [原水の種 浄水受水・ | | k•湧水 | | [原水の種 浄水受水・ | | K | | [原水の種 浄水受水・ | | 〈・浅井戸フ | k |
| | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 5,1 | 086 (m³) | [1日平均》 | 争水量] | 1,0 | 042 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 3,3 | 96 (m³) |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 1,2 - ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| トルエン | | | <0.040 | 1 | | | <0.040 | 1 | | | <0.040 | 1 |
| フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | 0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | 2.2 | 1 | | | 1.7 | 1 | | | 1.8 | 1 |
| 1,1,1ートリクロロエタン | | | <0.030 | 1 | | | <0.030 | 1 | | | <0.030 | 1 |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 1.5 | 1 | | | 0.7 | 1 | | | 0.9 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | -0.7 | 1 | | | -0.5 | 1 | | | -0.8 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | 2 | 1 | | | 10 | 1 | | | 2 | 1 |
| 1,1ージクロロエチレン | | | <0.0100 | 1 | | | <0.0100 | 1 | | | <0.0100 | 1 |
| ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | <0.000005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| 水温(℃) | 27.3 | 11.5 | 19.5 | 12 | 23.5 | 12.5 | 18.0 | 12 | 23.5 | 13.0 | 17.7 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | 1 | | | |

| | Г . + / . | . 7. 1 | | | r = ** -> /- | . 7. 1 | | | Г . + . + | . / 7 | | |
|--|----------------------|--------------|---------|------|-------------------------|--------|---------------------|----------|------------------------|------------------|---------|---------|
| | [事業主体 | | | | [事業主体 | | | | [事業主体 | | | |
| | 14 - 02 | 23 神熱 | 奈川県 | | 14 - 0 | 23 神 | 条川県 | | 14 - 02 | 23 神奈 | 川県 | |
| | 秦野市 | | | | 秦野市 | | | | 秦野市 | | | |
| | [浄水場名 | - | | | [浄水場名 | - | 00 | | [浄水場名 | = | 00 | |
| | 堀山下高 | 凶 配水场 | | | 東田原取 | 水場 | | | 向山配水: | 易 | | |
| 検査項目 | [水源名] 堀山下浄: | 水場受水 | | | [水源名] 東田原水 | 源 | | | [水源名] 諏訪越水 | 源 | | |
| | [原水の種 浄水受水 | 類] | | | [原水の種 深井戸水 | 類] | | | [原水の種 浄水受水・ | | ; | |
| | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | | (m³) | [1日平均》 | 争水量] | 1,4 | 102 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 1 | 41 (m³) |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 1,2 — ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| トルエン | | | <0.040 | 1 | | | <0.040 | 1 | | | <0.040 | 1 |
| フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | 2.0 | 1 | | | 2.2 | 1 | | | 1.7 | 1 |
| 1,1,1ートリクロロエタン | | | <0.030 | 1 | | | <0.030 | 1 | | | <0.030 | 1 |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 0.3 | 1 | | | 0.3 | 1 | | | 1.3 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | -1.4 | 1 | | | -0.6 | 1 | | | -0.4 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | 2 | 1 | | | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
| 1,1 ー ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | <0.0100 | 1 | | | <0.0100 <0.00005 | 1 | | | <0.0100 | 1 |
| | 20.5 | 0.0 | | 1 | 17.0 | 155 | | 1 | 02.5 | 140 | | 12 |
| 水温(℃) アンモニア態窒素 | 22.5 | 9.0 | 16.0 | 12 | 17.2 | 15.5 | 16.7 | 12 | 23.5 | 14.0 | 18.5 | 12 |
| ケンモニア 忠 至 系 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| | 事業主体 | - 夕] | | | 事業主体 | ·夕1 | | | 事業主体 | 夕1 | | |
|--|----------------|---------|---------------------|----------|----------------|--------|---------------------|----|----------------|--------|---------|---------|
| | | | /- 11118 | | | | /- 11118 | | | | шв | |
| | 14 - 0 | 23 作第 | 奈川県 | | 14 - 0 | 23 作第 | 奈川県 | | 14 - 02 | 23 仲宗 | 川県 | |
| | 秦野市 | | | | 秦野市 | | | | 秦野市 | | | |
| | [浄水場名 | i] 20 - | 00 | | [浄水場名 |] 21 - | 02 | | [浄水場名 |] 23 - | 00 | |
| | 城山配水 | 場 | | | 六間配水: | 場 | | | 堀山下低 | 区配水場 | | |
| 検査項目 | [水源名] 峰ノ下水源 | 亰 | | | [水源名] 本町第57 | K源(他1∶ | 水源と混合 | (1 | [水源名] 森戸下第2 | 2水源(他 | 3水源と混 | 合) |
| | [原水の種 浄水受水 | | k | | [原水の種 深井戸水 | 類] | | | [原水の種 深井戸水・ | | 〈•浅井戸ス | k |
| | [1日平均] 給水栓水 | 浄水量] | 4, | 189 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 2,3 | | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 2,8 | 77 (m³) |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 1,2 — ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| トルエン | | | <0.040 | 1 | | | <0.040 | 1 | | | <0.040 | 1 |
| フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | 0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | 3.0 | 1 | | | 1.2 | 1 | | | 3.9 | 1 |
| 1,1,1ートリクロロエタン | | | <0.030 | 1 | | | <0.030 | 1 | | | <0.030 | 1 |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 1.6 | 1 | | | 1.1 | 1 | | | 0.3 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | -0.7 | 1 | | | -0.1 | 1 | | | -0.8 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | 2 | 1 | | | 3 | 1 | | | 0 | 1 |
| 1,1 - ジクロロエチレン | | | <0.0100 | 1 | | | <0.0100 | 1 | | | <0.0100 | 1 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 04.0 | 100 | <0.000005 | 1 | 00.5 | 140 | 0.000013 | 1 | 10.5 | 140 | | 1 |
| 水温(°C) | 24.2 | 13.2 | 18.4 | 12 | 20.5 | 14.0 | 17.1 | 12 | 19.5 | 14.0 | 16.6 | 12 |
| アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 北子内政系安尔里(GOD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | + | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | 1 | | | | 1 | | | | | | | |

| 14 - 023 神奈川県 表野市 表野市 表野市 表野市 14 - 023 神奈川県 表野市 14 - 023 神奈川県 表野市 25 - 00 24 日本の小場 25 - 00 24 日本の小場 25 - 00 24 日本の小場 25 - 00 24 日本の小場 25 - 00 24 日本の小場 25 - 00 25 日本の小場 25 | | 「車 娄 主 休 | ·夕1 | | | 事業主体 | ·夕1 | | | 事業主体 | ·夕1 | | |
|--|--|----------|-------|-----------|----------|------|-------|-----------|----------|------|-------|----------|---------|
| #野市 #野市 #野市 #野市 #野市 #野市 #野市 #野市 #野市 #野市 | | | | | | | | | | | | | |
| 接番項目 | | | 23 神剣 | 余川県 | | | 23 神 | 余川県 | | 1 | 23 神余 | 川県 | |
| 接毛配水場 接毛配水場 接毛配水場 接毛配水場 大源名 大源名 大源名 大源名 大源名 大源名 大源名 大源名 大源名 大源名 大源名 大源名 大源名 大源名 大源名 大源大 他 1 大源大 他 1 大源大 他 1 大源大 上京 大源名 大源大 世界 大源大 上京 大源大 世界 大源大 世界 大源大 世界 大源大 世界 大源大 世界 大源大 世界 世界 世界 世界 世界 世界 世界 世 | | 秦野市 | | | | 秦野市 | | | | 秦野市 | | | |
| 検査項目 | | | - | 00 | | 1 | _ | 00 | | | - | 01 | |
| 要毛水源 | | 衰毛配水; | 場 | | | 洛合配水 | 場 | | | 寺山配水 | 場 | | |
| 日平均浄水量 613 (m) | 検査項目 | | | | | | 原(他1水 | 源と混合) | | | (他1水源 | と混合) | |
| 鈴水栓水 一切 | | | 類] | | | 1 | | k | | | | 井戸水 | |
| プラン及びその化合物 | | 1 | 争水量] | (| 613 (m³) | 1 | 争水量] | 3 | 347 (m³) | | 争水量] | 2,2 | 08 (m³) |
| 9ラン及びその化合物 | | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1 | アンチモン及びその化合物 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 | | | | 1 |
| 12-97)口口に対し | ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| Pint | | | | | | | | | | | | | |
| 79月胎が(2-15川ハキシル) (0.008 1 (0.008 1 (0.008 1 (0.008 1 (0.008 1 (0.008 1 (0.008 1 (0.008 1 (0.008 1 (0.008 1 (0.008 1 (0.008 1 (0.008 1 (0.001 1 (0.001 1 (0.001 1 (0.001 1 (0.001 1 (0.001 1 (0.001 1 (0.001 1 (0.001 1 (0.002 1 (0.002 1 (0.002 1 (0.002 1 (0.002 1 (0.002 1 (0.002 1 (0.002 1 (0.003 (0.003 1 (0.003 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 (0.003 1 | 1,2 — ジクロロエタン | | | | 1 | | | | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| 単塩未酸 | | | | | | | | | | | | | |
| 画能化塩素 | | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| ジクロハアやトーリル 抱水クロール 無素類 (0,001 1 1 0 0,002 1 1 0 0,000 1 1 0 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 投水クロラール | | | | | | | | | | | | | |
| 展業類 | | | | | | | | | | | | | |
| 接留塩素 0.4 0.3 0.4 12 0.6 0.3 0.4 12 0.6 0.3 0.4 12 0.4 0.2 0.3 12 過程放限 1.7 1 1 2.3 1 2.3 1 2.3 1 2.8 1 1 0.00300 1 1 0.00300 1 1 0.00300 1 1 0.00300 1 1 0.00300 1 1 0.00300 1 1 0.00300 1 1 0.00300 1 1 0.00300 1 1 0.00300 1 1 0.00300 1 1 0.00300 1 1 0.00300 1 1 0.00300 1 1 0.00300 1 1 0.00300 1 1 0.003000 1 1 0.00300 | | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 遊離校醱 1.7 1 2.8 1 1.1.1 - リフロロフタン (0.030 1 0. | | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 10 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 10 |
| 1.1.1 - トリクロロエタシ | | 0.4 | 0.3 | | | 0.6 | 0.3 | | | 0.4 | 0.2 | | |
| メチルー・ブチルエーテル (MTBE) 〈0.002 1 〈0.002 1 有機物等(過マゾガン解放)り点消費量) 0.3 1 0.3 1 臭気強度 (TON) 〈1 1 〈1 1 腐食性(ランゲリア指数) -1.7 1 -0.7 1 -0.9 1 従属栄養細菌 0 1 1 1 1 2 1 パルプロロエチレン 〈0.0100 1 〈0.0100 1 〈0.0100 1 水温(*C) 17.5 9.8 13.8 12 19.0 14.5 16.7 12 26.5 12.0 19.4 12 アンモニア態窒素 4 1 1 4 1 1 2 1 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 2 1 1 1 4 0 0 1 1 1 1 4 0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<> | | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 0.3 1 0. | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 具気強度(TON) | | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | | |
| 使属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 - ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | | |
| 水温(°C) 17.5 9.8 13.8 12 19.0 14.5 16.7 12 26.5 12.0 19.4 12 アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) (| | | | <0.0100 | | | | <0.0100 | | | | | |
| 水温(°C) 17.5 9.8 13.8 12 19.0 14.5 16.7 12 26.5 12.0 19.4 12 アンモニア態窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) (| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(BOD) 第本外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) (日本経典) 侵食性遊離炭酸 (日本経典) 全型力 (日本経典) リン酸イオン (日本経典) トリハロメタン生成能 (日本経典) 生物 (n/ml) (日本経典) アルカリ度 (日本経典) 溶存酸素 (日本経典) 硫酸イオン (日本経典) | 水温(℃) | 17.5 | 9.8 | 13.8 | 12 | 19.0 | 14.5 | 16.7 | | | 12.0 | 19.4 | 12 |
| 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リンリン酸イオン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン | アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リクリン酸イオン リン酸イオン トリハロメタシ生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン | 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) 食食性遊離炭酸 全窒素 ・ 全リン ・ リン酸イオン ・ トリハロメタシ生成能 ・ 生物 (n/ml) ・ アルカリ度 ・ 溶存酸素 ・ 硫酸イオン ・ | 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 全室素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 クリン タリン リン酸イオン タリン トリハロメタシ生成能 タリン 生物 (n/ml) タアルカリ度 溶存酸素 タイオン | | | | | | | | | | | | | |
| 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 生物 (n/ml) アルカリ度 タ存酸素 硫酸イオン (は、) (は、) (は、) (は、) (は、) (は、) (は、) (は、) | | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) アルカリ度 溶存酸素 (額はオン) | | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| | [事業主体 | (名) | | | [事業主体 | :名] | | | [事業主体 | :名] | | |
|--|----------------|---------|----------|----------|----------------|---------|----------|----------|--------------------------------|---------|----------|------|
| | 14 - 02 | | 奈川県 | | 14 - 02 | | 奈川県 | | 14 - 02 | | 川県 | |
| | | 23 TH 2 | ホハホ | | | 20 TH 2 | ホハホ | | | 20 TY 示 | 川木 | |
| | 秦野市 | | | | 秦野市 | | | | 秦野市 | | | |
| | [浄水場名 柳川配水: | _ | - 00 | | [浄水場名 神明開戸] | - | 00 | | [浄水場名 菖蒲配水: | _ | 00 | |
| 検査項目 | [水源名] 柳川水源 | | | | [水源名] 小原境水 | 源 | | | [水源名] (水源名] (八沢配水: 合) | 場受水(他 | 也1配水場: | 受水と混 |
| | [原水の種 湧水 | 類] | | | [原水の種 深井戸水・ | | k | | [原水の種 浄水受水 | 類] | | |
| | [1日平均》 | 争水量] | | 158 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 2 | 264 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | | (m³) |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 1,2 — ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| トルエン | | | <0.040 | 1 | | | <0.040 | 1 | | | <0.040 | 1 |
| フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | < 0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | 1.9 | 1 | | | 2.9 | 1 | | | 2.6 | 1 |
| 1,1,1ートリクロロエタン | | | <0.030 | 1 | | | <0.030 | 1 | | | <0.030 | 1 |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 0.5 | 1 | | | 0.3 | 1 | | | 0.3 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | -0.6 | 1 | | | -0.6 | 1 | | | -0.6 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | 1 | 1 | | | 0.0 | 1 | | | 7 | 1 |
| 1,1 - ジクロロエチレン | | | <0.0100 | 1 | | | <0.0100 | 1 | | | <0.0100 | 1 |
| 1,1 一 ングロロエアレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| 水温(°C) | 21.0 | 14.5 | 17.5 | | 21.0 | 13.8 | 17.7 | 12 | 23.0 | 13.8 | | 12 |
| アンモニア態窒素 | 21.0 | 14.3 | 17.5 | 12 | 21.0 | 13.8 | 17.7 | 12 | 23.0 | 13.8 | 18.5 | 12 |
| アプモニア思至系 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 11子的政系安水里(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| <u>全リン</u> リン酸イオン | + | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| | Г . — ж> | 4 1 | | | r _+ | 4 1 | | | r _+ | 4 1 | | |
|--|---------------------|------------|----------|---------|----------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|------------|--------------|----------|
| | [事業主体 | | | | [事業主体 | | | | [事業主体 | | | |
| | 14 - 02 | 23 神熱 | 条川県 | | 14 - 0 | 23 神 | 奈川県 | | 14 - 02 | 23 神奈 | 川県 | |
| | 秦野市 | | | | 秦野市 | | | | 秦野市 | | | |
| | [浄水場名 山居配水 | _ | 00 | | [浄水場名 横野配水 ⁵ | _ | 01 | | [浄水場名 菩提高区 | - | 00 | |
| 検査項目 | [水源名] 横野第2개 | 大源 | | | [水源名] 政ケ谷戸2 | 水源(他1 | 水源と混合 | †) | [水源名] 菩提水源 | | | |
| | [原水の種 湧水 | 類] | | | [原水の種 深井戸水・ | | | | [原水の種 深井戸水 | 類] | | |
| | [1日平均》 | 争水量] | | 30 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 2 | 227 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 2 | 161 (m³) |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 1,2 — ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| トルエン | | | <0.040 | 1 | | | <0.040 | 1 | | | <0.040 | 1 |
| フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | 3.4 | 1 | | | 4.1 | 1 | | | 2.3 | 1 |
| 1,1,1ートリクロロエタン | | | <0.030 | 1 | | | <0.030 | 1 | | | <0.030 | 1 |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 0.3 | 1 | | | 0.3 | 1 | | | 0.3 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | -0.5 | 1 | | | -0.4 | 1 | | | -1.0 | 1 |
| (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) | | | <0.0100 | 1 | | | 2 <0.0100 | 1 | | | 0 <0.0100 | 1 |
| 1,1 ー ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.0100 | 1 |
| 水温(°C) | 27.0 | 12.8 | 20.1 | 12 | 19.3 | 14.0 | 16.8 | 12 | 19.0 | 14.0 | 16.4 | 12 |
| アンモニア態窒素 | 27.0 | 12.0 | 20.1 | 12 | 19.3 | 14.0 | 10.0 | 12 | 19.0 | 14.0 | 10.4 | 12 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| | 事業主体 | (名) | | | 事業主体 | (名) | | | [事業主体 | :名] | | |
|--|----------------|--------|--------------|------|---------------|--------|--------------|----------|----------------------------|--------|---------|---------------|
| | 14 - 02 | | 奈川県 | | 14 - 0 | | 奈川県 | | 14 - 02 | | HIII | |
| | | 23 作9 | 示川宗 | | | 23 作: | 示川宗 | | | 23 仲示 | 川宗 | |
| | 秦野市 | | | | 秦野市 | | | | 秦野市 | | | |
| | [浄水場名 |] 36 - | 00 | | [浄水場名 |] 37 - | 01 | | [浄水場名 |] 38 - | 00 | |
| | 菩提低区 | 配水場 | | | 羽根配水: | 場 | | | 峠配水場 | | | |
| 検査項目 | [水源名] 菩提高区i | 配水場受 | 水 | | [水源名] 馬場水源 | (他2水源 | と混合) | | [水源名] 千村配水 [‡] | 場受水 | | |
| | [原水の種 浄水受水 | 類] | | | [原水の種 深井戸水 | 類] | | | [原水の種 浄水受水 | 類] | | |
| | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | | (m³) | [1日平均》 | 争水量] | 1,7 | 794 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | | (m³) |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 1,2 — ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| トルエン | | | <0.040 | 1 | | | <0.040 | 1 | | | <0.040 | 1 |
| フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | 1.9 | 1 | | | 2.5 | 1 | | | 1.8 | 1 |
| 1,1,1ートリクロロエタン | | | <0.030 | 1 | | | <0.030 | 1 | | | <0.030 | 1 |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 0.4 | 1 | | | 0.4 | 1 | | | 1.1 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | -0.8 | 1 | | | -0.7 | 1 | | | -0.7 | 1 |
| 従属栄養細菌 1,1ージクロロエチレン | | | 4 <0.0100 | 1 | | | 0 <0.0100 | 1 | | | <0.0100 | 1 |
| イルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.0100 | <u>'</u> 1 |
| 水温(°C) | 23.5 | 12.2 | 17.7 | 12 | 21.0 | 10.1 | 16.7 | 12 | 25.0 | 13.3 | 18.4 | 12 |
| アンモニア態窒素 | 23.3 | 12.2 | 17.7 | 12 | 21.0 | 10.1 | 10.7 | 12 | 23.0 | 10.0 | 10.4 | 12 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| - | [事業主体 | :名] | | | 事業主体 | :名] | | | [事業主体 | :名] | | |
|--|-------------|---------|-----------|---------|---------------|---------|-----------|------|----------------|---------|----------|------|
| | 14 - 02 | | 条川県 | | 14 - 0 | | 奈川県 | | 14 - 02 | | :1111目 | |
| | | 20 TH 7 | 示川宗 | | | 20 TH 7 | 示川宗 | | | 20 作示 | 川乐 | |
| | 秦野市 | | | | 秦野市 | | | | 秦野市 | | | |
| | [浄水場名 | | | | [浄水場名 | = | 00 | | [浄水場名 | _ | 00 | |
| | 八沢大久 | 保配水場 | | | 内久根配: | 水場 | | | 三廻部高 | 区配水場 | | |
| 検査項目 | [水源名] | 源 | | | [水源名] 城山配水 | 場受水 | | | [水源名] 堀山下浄: | 水場受水 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | [原水の種 湧水 | 類] | | | [原水の種 浄水受水 | 類] | | | [原水の種 浄水受水 | 類] | | |
| | [1日平均》 | 争水量] | | 70 (m³) | [1日平均》 | 争水量] | | (m³) | [1日平均》 | 争水量] | | (m³) |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 1,2 — ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| トルエン | | | <0.040 | 1 | | | <0.040 | 1 | | | <0.040 | 1 |
| フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | 0.003 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | 2.8 | 1 | | | 2.0 | 1 | | | 1.8 | 1 |
| 1,1,1 — トリクロロエタン | | | <0.030 | 1 | | | <0.030 | 1 | | | <0.030 | 1 |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 0.3 | 1 | | | 1.3 | 1 | | | 0.4 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | -0.5 | 1 | | | -0.7 | 1 | | | -1.4 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | 160 | 1 | | | 2 | 1 | | | 0 | 1 |
| 1,1 — ジクロロエチレン | | | <0.0100 | 1 | | | <0.0100 | 1 | | | <0.0100 | 1 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| 水温(℃) | 23.0 | 13.8 | 18.5 | 12 | 25.0 | 13.0 | 18.7 | 12 | 23.5 | 9.5 | 17.2 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| | [事業主体 | :名] | | | 事業主体 | :名] | | | [事業主体 | (名) | | |
|--|----------------|----------|------------|----------|---------------|--------|----------|----------|----------------|-------------------|-----------|---------|
| | 14 - 02 | | 奈川県 | | 14 - 02 | | 奈川県 | | 14 - 02 | | :1110旦 | |
| | | 20 147 | 75 JUJ 775 | | | 20 147 | ホルス | | | ²⁰ 1박자 | אווית | |
| | 秦野市 | | | | 秦野市 | | | | 秦野市 | | | |
| | [浄水場名 |] 42 - | - 00 | | [浄水場名 |] 44 - | 00 | | [浄水場名 |] 45 - | 00 | |
| | 湯の沢高口 | 区配水場 | | | 戸川取水 | 場 | | | 本町第11 | 取水場 | | |
| 検査項目 | [水源名] | . | | | [水源名] | | | | [水源名] | -l. 7E | | |
| | 沢の下水湯 | | | | 戸川水源 | | | | 本町第11 | 水源 | | |
| | [原水の種 深井戸水 | 類] | | | [原水の種 深井戸水 | 類] | | | [原水の種 深井戸水 | 類] | | |
| | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | | 166 (m³) | [1日平均活 | 争水量] | 1,0 | 067 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 1,3 | 02 (m³) |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 1,2 — ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| トルエン | | | <0.040 | 1 | | | <0.040 | 1 | | | <0.040 | 1 |
| フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | 1.8 | 1 | | | 3.3 | 1 | | | 1.9 | 1 |
| 1,1,1ートリクロロエタン | | | <0.030 | 1 | | | <0.030 | 1 | | | <0.030 | 1 |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 0.3 | 1 | | | 0.3 | 1 | | | 1.0 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | -0.4 | 1 | | | -0.7 | 1 | | | -0.5 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | 0.1 | 1 | | | 0.7 | 1 | | | 5 | 1 |
| 1,1ージクロロエチレン | | | <0.0100 | 1 | | | <0.0100 | 1 | | | <0.0100 | 1 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | <0.000005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.000005 | 1 |
| 水温(°C) | 28.0 | 11.0 | 20.1 | 12 | 16.5 | 15.5 | 15.9 | 12 | 17.0 | 15.0 | 16.4 | 12 |
| アンモニア態窒素 | 20.0 | | 20.1 | | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | 17.0 | 10.0 | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| | [事業主体 14 - 02 中井町 「浄水場名 | 24 神系 | ※川県 | | [事業主体 14 - 0 中井町 「浄水場名 | 24 神秀 | 奈川県 | | [事業主体 14 - 02 中井町 「浄水場名 | 24 神奈 | | |
|--|----------------------------------|-------|------------|----------|---------------------------------|-------|------|----------|----------------------------------|-------|------|----------|
| | 久所浄水: | - | 00 | | 北窪取水 | - | 00 | | 宮原取水 | • | 00 | |
| 検査項目 | [水源名] 北田水源 | | | | [水源名] 北窪水源 | | | | [水源名] 宮原水源 | | | |
| | [原水の種 深井戸水 | | | | [原水の種 深井戸水 | | < | | [原水の種 深井戸水 | | | |
| | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 3, | 311 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | ! | 912 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | | ţ | 509 (m³) |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2 — ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | J., | 0.0 | • | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1.1.1ートリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 - ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(°C) | 26.0 | 11.0 | 18.5 | 12 | 24.5 | 13.0 | 18.3 | 12 | 23.0 | 13.0 | 18.3 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | ·- | • | | | | | • | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | ĺ | | | | İ | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| | [事業主体 | 名] | | | [事業主体 | :名] | | | [事業主体 | 名] | | |
|--|---------------|--------|--|----------|---|--------|------|----------|---|--------|------|----------|
| | 14 - 02 | 24 神系 | シェア シェア シェア シェア シェア シェア シェア シェア アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイ | | 14 - 0 | 24 神子 | 奈川県 | | 14 - 02 | 24 神奈 | 川県 | |
| | 中井町 | - 11/2 | | | 中井町 | 112 | | | 中井町 | - 1123 | | |
| | 中开则 | | | | 中开叫 | | | | 中开则 | | | |
| | [浄水場名 |] 04 - | 00 | | [浄水場名 |] 05 - | 00 | | [浄水場名 |] 06 - | 00 | |
| | 大久保取: | 水場 | | | 雑色取水: | 場 | | | 岩倉取水: | 場 | | |
| 検査項目 | [水源名] | | | | [水源名] | | | | [水源名] | | | |
| 快旦块口 | 大久保水 | 源 | | | 雑色水源 | | | | 岩倉水源 | | | |
| | [原水の種 深井戸水 | | | | [原水の種 深井戸水 | 類] | | | [原水の種 深井戸水 | 類] | | |
| | 31017 | | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | |
| | [1日平均》 | 争水量] | | 221 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 4 | 129 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | ţ | 503 (m³) |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | İ | | | | | | | |
| 1,2 - ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 |
| 1,1,1 ー トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 — ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 25.0 | 12.0 | 18.2 | 12 | 26.0 | 9.0 | 18.1 | 12 | 27.0 | 11.0 | 19.0 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| | [事業主体 | 名] | | | [事業主任 | 本名] | | | 事業主体 | (名] | | |
|--|----------------|--------|----------|-----------|----------------|--------------|------|------|-----------------|-----------|-------|----------|
| | 14 - 0 | | 泉川県 | | 14 - | | 奈川県 | | 14 - 02 | | 川県 | |
| | | 20 172 | 71175 | | | JZ / 1T | ホハハ | | | -/ TT 75 | אלויל | |
| | 開成町 | | | | 大井町 | | | | 大井町 | | | |
| | [浄水場名 高台第一 | - | | 争水場 | [浄水場4 第1浄水 | 名] 01 · 場 | - 00 | | [浄水場名 第2浄水場 | - | 00 | |
| | 榎下浄水 | | 3 L XI—7 | T //(-8/) | איזיינג | 793 | | | 312/7/13 | 23 | | |
| 検査項目 | [水源名] 第1、第2 | 、第3、第 | 4、第5水 | 源 | [水源名] 第1·第2 | | | | [水源名] 第3·4·5 | •6•7水源 | į | |
| | [原水の種 深井戸水 | | | | [原水の科 深井戸水 | | | | [原水の種 深井戸水 | 類] | | |
| | [1日平均; 給水栓水 | | 6, | 045 (m³) | [1日平均 | 浄水量] | | (m³) | [1日平均》 | 争水量] | 6,4 | l61 (m³) |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2 — ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 12 | | | | | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4 |
| 1,1,1ートリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | 1 | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | 0.5 | 0.0 | -0.7 | 4 |
| (成長性(フクワット自致) (位属栄養細菌) | | | | | | | | | -0.5 15 | -0.8 5 | -0.7 | 4 |
| 作属木食和困 1,1 - ジクロロエチレン | | | | | | | | | 15 | 5 | 8 | 4 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(°C) | | | | | | | | | 25.3 | 12.8 | 18.5 | 12 |
| アンモニア熊窒素 | | | | | | | | | 25.5 | 12.0 | 10.0 | 12 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| | [事業主体 14 - 05 箱根町 [浄水場名 小涌谷第 | 28 神系 i] 01 - | 奈川県 ・ 00 | | [事業主体 14 - 0 箱根町 [浄水場名 元箱根第 | 28 神] 02 - | 奈川県 | | [事業主体 14 - 02 箱根町 [浄水場名 大平台配2 | 28 神奈 i] 04 - | | |
|--|--|------------------|-------------|---------|---|----------------|---------|----------|---|------------------|--------------|----------|
| 検査項目 | [水源名] 蛇骨川水 | 源 | | | [水源名] お玉ヶ池水 | 〈源 | | | [水源名] 大平台水 | 源 | | |
| | [原水の種 湧水 | 類] | | | [原水の種 湧水 | 類] | | | [原水の種 湧水 | 類] | | |
| | [1日平均] 給水栓水 | 浄水量] | | 777 (㎡) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 1,0 |)53 (m³) | [1日平均》 給水栓水 | 争水量] | 7 | 790 (m³) |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 1,2 — ジクロロエタン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| トルエン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | 11.0 | 1 | | | 8.9 | 1 | | | 4.2 | 1 |
| 1,1,1ートリクロロエタン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | -1.6 | 1 | | | -1.8 | 1 | | | -1.6 | 1 |
| 従属栄養細菌 1.1 ジワロロエチレン | | | 70 | 1 | | | 38 | 1 | | | 4 <0.0001 | 1 |
| 1,1 ー ジクロロエチレン ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| 水温(°C) | 28.2 | 7.9 | 19.6 | 12 | 22.2 | 11.6 | 16.7 | 12 | 19.8 | 11.0 | 15.7 | 12 |
| アンモニア態窒素 | 20.2 | 1.9 | 19.0 | 12 | 22.2 | 11.0 | 10.7 | 12 | 19.0 | 11.0 | 13.7 | 12 |
| ケンモニア 忠 至 系 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| | I= 1 | | | | I= 1 | | | | I= 1 | | | |
|--|------------|--------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-----------|
| | [事業主体 | 名] | | | [事業主体 | :名] | | | [事業主体 | :名] | | |
| | 14 - 0 | 28 神系 | 急川県 | | 14 - 0 | 28 神系 | 急川県 | | 14 - 02 | 28 神奈 | 川県 | |
| | 箱根町 | | | | 箱根町 | | | | 箱根町 | | | |
| | 7610. | | | | ויים וערים | | | | נייאויםו | | | |
| | [浄水場名 | 1 05 - | . 00 | | [浄水場名 | 1 06 - | 00 | | [浄水場名 | 1 07 - | 00 | |
| | | | 00 | | 1 | - | 00 | | | - | 00 | |
| | 湯本茶屋 | 净水场 | | | 葛原浄水 | 芴 | | | 箱根第2酉 | 6水池 | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | [_LNE 47 | | | | [_l, YE 42] | | | | | | | |
| 検査項目 | [水源名] | | | | [水源名] | | | | [水源名] | | | |
| | 初花水源 | | | | 大沢ニノ戸 | 天狗沢水 | (源 | | 箱根第27 | K源 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 44 | | | | | | | | | | |
| | [原水の種 | | | | [原水の種 | · · · - | | | [原水の種 | 類」 | | |
| | 表流水(自 | 1流) | | | 湧水・表流 | 水(自流) |) | | 深井戸水 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | [1日平均》 | △水県1 | 1. | 411 (m³) | [1日平均》 | 요 - 사 - 문] | 3.3 | 204 (m³) | [1日平均》 | 요 과 문] | - | 578 (m³) |
| | | ず小里 」 | 1,4 | +11 (111) | 1 | ザ小里」 | 3,0 | 004 (111) | | ザ小里 」 | | 176 (111) |
| | 給水栓水 | | | | 給水栓水 | | | | 給水栓水 | | | |
| 7. 77. 7.67.0 U.A.W. | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| ウラン及びその化合物 ニッケル及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| | | | <0.001 <0.0002 | 1 | | | <0.001 <0.0002 | 1 | | | <0.001 <0.0002 | 1 |
| トルエン | | | <0.001 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| <u>「ルエノ</u> フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | ₹0.000 | ' | | | ₹0.000 | ' | | | ₹0.003 | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | 4.8 | 1 | | | 4.0 | 1 | | | 3.6 | 1 |
| 1,1,1 — トリクロロエタン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | -1.5 | 1 | | | -1.6 | 1 | | | -0.9 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | 5 | 1 | | | 11 | 1 | | | 5 | 1 |
| 1,1 - ジクロロエチレン | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 26.9 | 10.1 | 18.3 | 12 | 18.5 | 10.1 | 14.4 | 12 | 24.9 | 7.2 | 16.2 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| servical errors | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| | [事業主体 | :名] | | | 事業主体 | (名) | | | 事業主任 | 太名] | | |
|--|----------------|--------|---------|----------|----------------|---------|---------|----------|---------------|------|----|------|
| | 14 - 02 | | 泉川県 | | 14 - 0 | | 奈川県 | | | | | |
| | | 20 ቸቸን | スハス | | | 20 TH 7 | ホハホ | | | | | |
| | 箱根町 | | | | 箱根町 | | | | | | | |
| | [浄水場名 鷹ノ巣配力 | - | 00 | | [浄水場名 大芝第2ポ | | 00 | | [浄水場名 | 名] - | - | |
| 検査項目 | [水源名] 鷹ノ巣第2 | :水源 | | | [水源名] 蛭川第1訇 | 第2神社水 | 〈源 | | [水源名] | | | |
| | [原水の種 深井戸水 | 類] | | | [原水の種 深井戸水 | 類] | | | [原水の種 | 重類] | | |
| | [1日平均》 | 争水量] | 1, | 011 (m³) | [1日平均》 | 争水量] | 1, | 584 (m³) | [1日平均 給水栓水 | | | (m³) |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | < 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| 1,2 - ジクロロエタン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| トルエン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) | | | <0.005 | 1 | | | <0.005 | 1 | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | İ | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| 抱水クロラール | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | | | | |
| 遊離炭酸 | | | 7.6 | 1 | | | 3.3 | 1 | | | | |
| 1,1,1ートリクロロエタン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| メチルーtーブチルエーテル(MTBE) | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | (0.001 | | | | (0.001 | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | -1.6 | 1 | | | -0.8 | 1 | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | 8 | 1 | | | 4 | 1 | | | | |
| 1,1 - ジクロロエチレン | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | (0.0001 | ' | | | \0.0001 | | | | | |
| 水温(°C) | 21.2 | 14.5 | 17.4 | 12 | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | 21.2 | 17.0 | 17.4 | 12 | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | 1 | | | | | | | | 1 | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | + | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | 1 | | | - |
| 硫酸イオン | + | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | 1 | | | |