| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 001 茨城県<br>水戸市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>開江浄水場<br><br>[水源名]<br>那珂川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 46,499(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 001 茨城県<br>水戸市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>椿川浄水場<br><br>[水源名]<br>椿川ダム(那珂川)<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 40,701(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 002 茨城県<br>日立市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>森山浄水場(1系列)<br><br>[水源名]<br>久慈川水系<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 40,571(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 12 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 12 | | | | |
| ウラン及びその化合物 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 12 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 12 | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| 1,2－ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 12 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 12 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 12 |
| トルエン | <0.040 | <0.040 | <0.040 | 12 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 12 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 12 | | | | |
| 亜塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 12 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 12 | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 12 | 0.003 | <0.001 | 0.002 | 12 | | | | |
| 抱水クロラール | 0.007 | <0.002 | 0.002 | 12 | 0.011 | 0.002 | 0.005 | 12 | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | 3.1 | 1.3 | 2.0 | 12 | 3.9 | 1.8 | 2.7 | 12 | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 12 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | 3.8 | 1.4 | 2.7 | 12 |
| 臭気強度(TON) | <1 | <1 | <1 | 12 | <1 | <1 | <1 | 12 | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | −0.7 | −1.2 | −1.0 | 12 | −0.9 | −1.3 | −1.1 | 12 | −1.2 | −2.0 | −1.6 | 12 |
| 従属栄養細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1,1－ジクロロエチレン | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 12 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 12 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 12 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.000003 | 0.000002 | 0.000002 | 4 | 0.000003 | 0.000002 | 0.000002 | 4 | | | | |
| 水温(℃) | 29.2 | 11.1 | 19.6 | 12 | 29.7 | 9.2 | 18.8 | 12 | 32.4 | 8.7 | 19.5 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | 46.0 | 28.0 | 39.0 | 12 |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | 17.0 | 12.0 | 14.0 | 12 |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 002 茨城県<br>日立市<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>森山浄水場(2系列)<br><br>[水源名]<br>久慈川水系<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 40,571 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 002 茨城県<br>日立市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>十王浄水場<br><br>[水源名]<br>十王川水系<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 12,028 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 002 茨城県<br>日立市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>いぶき台配水場<br><br>[水源名]<br>いぶき台(地下水)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 0 (㎥)<br>休止中 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 12 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 12 | | | | |
| トルエン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 12 | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3.0 | 1.3 | 2.2 | 12 | 2.1 | 1.1 | 1.6 | 12 | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | −0.9 | −1.9 | −1.4 | 12 | −1.2 | −1.9 | −1.6 | 12 | | | | |
| 従属栄養細菌 | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 12 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 12 | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 27.8 | 8.8 | 18.6 | 12 | 26.2 | 8.2 | 17.4 | 12 | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | 50.0 | 27.0 | 39.0 | 12 | 33.0 | 26.0 | 30.0 | 12 | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | 16.0 | 11.0 | 14.0 | 12 | 6.2 | 4.8 | 5.3 | 12 | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 002 茨城県<br>日立市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>中里浄水場<br><br>[水源名]<br>中里(地下水)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 38 (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>08 － 002 茨城県<br>日立市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>諏訪浄水場<br><br>[水源名]<br>諏訪(地下水)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 17 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 003 茨城県<br>北茨城市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>華川浄水場<br><br>[水源名]<br>大北川水系花園川<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 5,868 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | <0.002 | 1 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 12 | | | | |
| トルエン | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | 0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | 2.2 | 1 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 12 | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | 0.4 | −1.1 | −0.2 | 12 | | | −1.7 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | | | <30 | 1 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 12 | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | 27.8 | 7.5 | 18.0 | 12 | 28.0 | 9.6 | 18.4 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | 99.0 | 76.0 | 94.0 | 12 | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | 36.0 | 34.0 | 35.0 | 12 | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 003 茨城県<br>北茨城市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>中郷浄水場<br><br>[水源名]<br>大北川水系大北川<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 10,338(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 004 茨城県<br>ひたちなか市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>上坪浄水場<br><br>[水源名]<br>那珂川水系那珂川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 37,662(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 004 茨城県<br>ひたちなか市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>上ヶ砂配水場<br><br>[水源名]<br>着水井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 7,515(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 2 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 2 |
| ウラン及びその化合物 | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.002 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| トルエン | | | | | <0.040 | <0.040 | <0.040 | 2 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | 2 |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| 農薬類 | | | | | | | 0.00 | 1 | | | 0.00 | 1 |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | 2.2 | 1 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | 2 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 2 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 2 |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 2 | 1.9 | 0.5 | 1.2 | 2 |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | <1 | <1 | 2 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | −1.5 | 1 | −1.5 | −1.7 | −1.6 | 2 | −0.2 | −0.4 | −0.3 | 2 |
| 従属栄養細菌 | | | <30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 2 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 2 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 |
| 水温(℃) | 28.8 | 8.2 | 18.3 | 12 | 29.0 | 8.0 | 18.1 | 12 | 28.0 | 10.0 | 18.4 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 007 茨城県<br>土浦市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>大岩田配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 12,551 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 007 茨城県<br>土浦市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>神立配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 15,108 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 007 茨城県<br>土浦市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>右籾配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 8,852 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 32.0 | 10.0 | 20.9 | 12 | 32.0 | 9.0 | 20.1 | 12 | 32.0 | 10.0 | 20.6 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 007 茨城県<br>土浦市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>新治浄配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 2,784 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 008 茨城県<br>阿見町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>上郷配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 8,216 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 008 茨城県<br>阿見町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>追原配水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,396 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 31.0 | 11.0 | 20.6 | 12 | 26.0 | 11.0 | 18.0 | 12 | 30.5 | 9.5 | 20.1 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 008 茨城県<br>阿見町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>福田浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,318 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 010 茨城県<br>古河市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>古河浄水場3号井戸他2<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 86 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 010 茨城県<br>古河市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>思川浄水場<br><br>[水源名]<br>利根川水系思川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 37,247 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 12 | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 28.5 | 11.9 | 19.8 | 12 | 30.2 | 9.4 | 19.0 | 12 | 29.7 | 10.3 | 19.3 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | 50.5 | 31.5 | 42.4 | 4 | 53.5 | 33.5 | 42.5 | 4 |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 010 茨城県<br>古河市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>三和浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 6,854 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 012 茨城県<br>潮来市<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>田の森配水場<br><br>[水源名]<br>利根川荒川水系北浦<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 0 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 013 茨城県<br>結城市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>本町浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,849 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 60 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 24.4 | 12.9 | 19.3 | 12 | | | | | 29.5 | 9.0 | 19.3 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 013 茨城県<br>結城市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>林浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水・県水受水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 6,184 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 015 茨城県<br>茨城県南水道企業団<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>若柴配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 21,978 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 015 茨城県<br>茨城県南水道企業団<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>牛久配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 14,891 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 30.5 | 11.0 | 20.1 | 12 | 30.8 | 9.3 | 19.4 | 12 | 30.1 | 8.1 | 18.5 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 015 茨城県<br>茨城県南水道企業団<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>戸頭配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 18,758 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 015 茨城県<br>茨城県南水道企業団<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>藤代配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 7,443 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 015 茨城県<br>茨城県南水道企業団<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>利根配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 4,289 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 31.6 | 9.4 | 19.9 | 12 | 29.6 | 8.1 | 18.3 | 12 | 31.0 | 6.9 | 19.0 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 016 茨城県<br>湖北水道企業団<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>柏原配水場<br><br>[水源名]<br>柏原4号井、恋瀬1～5号井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 6,270 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 016 茨城県<br>湖北水道企業団<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>玉里新配水場<br><br>[水源名]<br>玉里2，3，4，5，6，8号井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 6,536 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 017 茨城県<br>大洗町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>夏海浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,648 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | <0.0020 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| トルエン | | | | | | | | | | | <0.004 | 1 |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | <0.006 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | 0.06 | 1 | | | 0.06 | 1 | | | <0.05 | 1 |
| 二酸化塩素 | | | 0.06 | 1 | | | 0.06 | 1 | | | <0.05 | 1 |
| ジクロロアセトニトリル | | | 0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 | | | 0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | 0.4 | 1 | | | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | 4.0 | 1 | | | 4.0 | 1 | | | 0.9 | 1 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 1.2 | 1 | | | 1.8 | 1 | | | 1.0 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | −1.0 | 1 | | | −0.5 | 1 | | | −0.3 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | 1 | 1 | | | 98 | 1 | | | <30 | 1 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | 0.000005 | 1 | | | 0.000005 | 1 | | | 0.000004 | 1 |
| 水温(℃) | 26.5 | 11.0 | 18.9 | 12 | 31.5 | 11.0 | 19.9 | 12 | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 017 茨城県<br>大洗町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>大貫浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 511 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 017 茨城県<br>大洗町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>中央配水場<br><br>[水源名]<br>那珂川水系(那珂川)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 4,208 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 018 茨城県<br>大子町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>大子浄水場<br><br>[水源名]<br>1級河川八溝川表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 1,892 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| トルエン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | <0.006 | 1 | | | <0.006 | 1 | | | | |
| 亜塩素酸 | | | <0.05 | 1 | | | <0.05 | 1 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2 |
| 二酸化塩素 | | | <0.05 | 1 | | | <0.05 | 1 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2 |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| 抱水クロラール | | | 0.004 | 1 | | | 0.002 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | 1.2 | 1 | | | 2.1 | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 1.0 | 1 | | | 0.7 | 1 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 2 |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 2 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | −0.7 | 1 | | | −0.7 | 1 | −1.6 | −1.6 | −1.6 | 2 |
| 従属栄養細菌 | | | <30 | 1 | | | <30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 2 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | 0.000003 | 1 | | | 0.000003 | 1 | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | 27.0 | 8.0 | 17.0 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 018 茨城県<br>大子町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>下金沢浄水場<br><br>[水源名]<br>湧水(沢水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 97(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 018 茨城県<br>大子町<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>芦野倉浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(浅井戸)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 844(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 018 茨城県<br>大子町<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>上金沢浄水場<br><br>[水源名]<br>湧水(沢水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 122(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 12 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 27.0 | 7.0 | 16.6 | 12 | 26.0 | 7.0 | 16.4 | 12 | 27.0 | 4.0 | 15.0 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 018 茨城県<br>大子町<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>頃藤浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(浅井戸)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 628(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 018 茨城県<br>大子町<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>西金浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(浅井戸)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 349(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 018 茨城県<br>大子町<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>生瀬浄水場<br><br>[水源名]<br>1級河川久慈川表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 873(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 12 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 12 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 27.0 | 8.0 | 16.5 | 12 | 28.0 | 6.0 | 17.0 | 12 | 28.0 | 6.5 | 17.1 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 018 茨城県<br>大子町<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>中郷浄水場<br><br>[水源名]<br>湧水(沢水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 68(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 018 茨城県<br>大子町<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>左貫浄水場<br><br>[水源名]<br>湧水(沢水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 347(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 018 茨城県<br>大子町<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>大沢浄水場<br><br>[水源名]<br>湧水(沢水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 75(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 24.0 | 7.0 | 16.9 | 12 | 28.0 | 5.0 | 16.2 | 12 | 27.0 | 9.0 | 16.5 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 018 茨城県<br>大子町<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>蛇穴浄水場<br><br>[水源名]<br>湧水(沢水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 6(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 018 茨城県<br>大子町<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>上岡浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(浅井戸)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,991(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 018 茨城県<br>大子町<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>上野宮浄水場<br><br>[水源名]<br>湧水(沢水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 231(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 24.0 | 5.0 | 15.1 | 12 | 26.0 | 8.0 | 16.5 | 12 | 23.0 | 4.0 | 14.3 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 021 茨城県<br>高萩市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>第一浄水場<br><br>[水源名]<br>花貫川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 6,373 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 021 茨城県<br>高萩市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>関口浄水場<br><br>[水源名]<br>大北川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 2,408 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 023 茨城県<br>常陸大宮市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>大宮浄水場<br><br>[水源名]<br>久慈川(浅井戸と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 8,650 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | <0.0020 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | <0.002 | 1 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | <0.0004 | 1 |
| トルエン | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | <0.008 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | <0.06 | 1 |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | <0.06 | 1 |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 16 | | | | | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | 4.4 | 1 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | 1.9 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | <0.0 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | 0 | 1 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | <0.0010 | 1 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | <0.000005 | 1 |
| 水温(℃) | 27.2 | 9.4 | 18.1 | 16 | 28.0 | 9.6 | 18.5 | 12 | 26.8 | 7.2 | 17.5 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 023 茨城県<br>常陸大宮市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>大場浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸(八幡井)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>08 － 023 茨城県<br>常陸大宮市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>西野内浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸(西野内取水場)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,062 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 023 茨城県<br>常陸大宮市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>小貫浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸(小貫浄水場内・小貫浄水場仮井戸)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,102 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 12 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | 28.0 | 10.0 | 17.9 | 12 | 27.0 | 9.0 | 17.5 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 023 茨城県<br>常陸大宮市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>家和楽浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸(家和楽浄水場内)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,017(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 023 茨城県<br>常陸大宮市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>美和浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸(第1取水場・第2取水場・第3取水場)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,202(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 023 茨城県<br>常陸大宮市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>緒川浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸(緒川浄水場内)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 825(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 27.5 | 8.5 | 17.8 | 12 | 28.6 | 9.0 | 18.3 | 12 | 25.5 | 7.2 | 16.4 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 023 茨城県<br>常陸大宮市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>上小瀬浄水場<br><br>[水源名]<br>那珂川(伏流水)浅井戸(第1取水場)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 516(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 023 茨城県<br>常陸大宮市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>北部浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸(北部取水場)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,166(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 023 茨城県<br>常陸大宮市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>下伊勢畑浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸(下伊勢畑浄水場内)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 118(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 29.3 | 8.0 | 18.1 | 12 | 25.2 | 11.1 | 18.3 | 12 | 22.3 | 10.8 | 16.8 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 023 茨城県<br>常陸大宮市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>上伊勢畑浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸(上伊勢畑浄水場内)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 169(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 024 茨城県<br>鹿嶋市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>宮中浄水場<br><br>[水源名]<br>県水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 18,679(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 024 茨城県<br>鹿嶋市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>大野配水場<br><br>[水源名]<br>県水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 1,988(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 12 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 24 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 72 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 28.0 | 10.0 | 18.5 | 4 | 29.8 | 8.1 | 19.9 | 24 | 30.0 | 7.4 | 19.7 | 72 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 026 茨城県<br>那珂市<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>後台浄水場<br><br>[水源名]<br>那珂川水系那珂川<br><br>[原水の種類]<br>原水受水<br><br>[1日平均浄水量] 3,077 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 026 茨城県<br>那珂市<br><br>[浄水場名] 01 － 02<br>後台浄水場<br><br>[水源名]<br>東木倉深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 734 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 026 茨城県<br>那珂市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>木崎浄水場<br><br>[水源名]<br>久慈川水系久慈川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 7,768 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 28.5 | 9.0 | 18.7 | 12 | 28.5 | 9.0 | 18.7 | 12 | 28.9 | 8.5 | 18.5 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 026 茨城県<br>那珂市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>芳野配水場<br><br>[水源名]<br>茨城県県中央広域水道<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 2,918 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 026 茨城県<br>那珂市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>瓜連配水場<br><br>[水源名]<br>茨城県県中央広域水道<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 1,075 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 027 茨城県<br>つくば市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>中央配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 35,099 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 24.0 | 9.0 | 16.6 | 12 | 30.0 | 9.9 | 19.6 | 12 | 30.8 | 8.6 | 19.6 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 027 茨城県<br>つくば市<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>中央配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 35,099 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 027 茨城県<br>つくば市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>君島配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 4,669 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 027 茨城県<br>つくば市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>葛城配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 17,415 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 30.9 | 9.6 | 19.8 | 12 | 30.2 | 8.2 | 18.8 | 12 | 26.3 | 12.0 | 18.9 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 027 茨城県<br>つくば市<br><br>[浄水場名] 12 － 01<br>葛城配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 17,415 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 027 茨城県<br>つくば市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>南部配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 14,913 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 029 茨城県<br>東海村<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>外宿浄水場<br><br>[水源名]<br>久慈川水系<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 9,692 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 30.9 | 8.9 | 19.8 | 12 | 30.0 | 9.8 | 19.9 | 12 | 29.2 | 7.5 | 18.6 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 030 茨城県<br>境町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>境浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸・浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,763 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 030 茨城県<br>境町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>伏木浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸・浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 319 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 035 茨城県<br>美浦村<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>美浦村水道配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 5,911 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 12 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 12 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 48 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 28.0 | 11.0 | 19.0 | 12 | 29.0 | 9.0 | 18.5 | 12 | 31.5 | 7.5 | 19.4 | 48 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 042 茨城県<br>守谷市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>守谷市配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 048 茨城県<br>下妻市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>砂沼浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸1～7号<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 6,226 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 048 茨城県<br>下妻市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>宗道浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸1～2号<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 914 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 12 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 |
| 水温(℃) | | | | | 28.0 | 12.0 | 19.3 | 12 | 27.0 | 10.0 | 18.5 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 050 茨城県<br>河内町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>長竿配水場<br><br>[水源名]<br>県南広域水道用水供給事業<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 052 茨城県<br>八千代町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>八千代町浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸〔1号井戸(他3井戸と混合)〕・県<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 3,200 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 057 茨城県<br>五霞町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>小手指配水場<br><br>[水源名]<br>埼玉県水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 12 | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 28.0 | 6.0 | 17.0 | 12 | 24.6 | 10.8 | 18.6 | 12 | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 057 茨城県<br>五霞町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>川妻浄水場<br><br>[水源名]<br>利根川水系<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 1,809 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 058 茨城県<br>茨城町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>北部浄水場<br><br>[水源名]<br>北部浄水場12号井(他3水源)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 5,693 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 058 茨城県<br>茨城町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>南部浄水場<br><br>[水源名]<br>南部浄水場4号井(他9水源)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 7,186 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | <0.002 | 1 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | <0.05 | 1 |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | <0.05 | 1 |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | 3.7 | 1 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | 0.6 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | −0.7 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | <30 | 1 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | 0.000006 | 1 |
| 水温(℃) | 28.7 | 11.0 | 19.6 | 12 | 30.0 | 10.8 | 19.7 | 12 | 29.5 | 11.0 | 19.3 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 062 茨城県<br>神栖市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>神栖知手配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 18,543 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 062 茨城県<br>神栖市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>波崎別所配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 3,776 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 068 茨城県<br>石岡市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>下林浄水場<br><br>[水源名]<br>下林第一水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,215 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 068 茨城県<br>石岡市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>園部浄水場<br><br>[水源名]<br>園部第一水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,041 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 068 茨城県<br>石岡市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>中央浄水場<br><br>[水源名]<br>中央第一水源(他浄水受水)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 1,797 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 068 茨城県<br>石岡市<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>山崎浄水場<br><br>[水源名]<br>山崎第一水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 591 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 12 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 12 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 085 茨城県<br>かすみがうら市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>志筑野寺浄水場<br><br>[水源名]<br>浄水場からの送水(地下水及び県水)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>08 － 085 茨城県<br>かすみがうら市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>下稲吉第二浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水、県水、浄水場からの送水(地下水及び県水)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 1,328(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 085 茨城県<br>かすみがうら市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>霞ヶ浦浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水、県水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 5,920(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | 30.5 | 9.0 | 19.6 | 12 | 28.0 | 10.2 | 19.1 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 086 茨城県<br>桜川市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>富谷配水場<br><br>[水源名]<br>県西用水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 086 茨城県<br>桜川市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>坂戸浄配水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,031 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 086 茨城県<br>桜川市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>真壁浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 2,231 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 086 茨城県<br>桜川市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>羽田配水場<br><br>[水源名]<br>県西用水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 599 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 086 茨城県<br>桜川市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>高久浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 377 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 087 茨城県<br>坂東市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>岩井浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水・浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 3,467 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 12 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | 0.000005 | 1 |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 087 茨城県<br>坂東市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>神田山配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 1,807 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 087 茨城県<br>坂東市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>駒跼配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 1,325 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 087 茨城県<br>坂東市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>猿島浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水・浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 2,321 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 12 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 12 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | 0.000005 | 1 |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 088 茨城県<br>稲敷市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>江戸崎浄水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水・地下水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,684 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 088 茨城県<br>稲敷市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>根本浄水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水・地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 343 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 088 茨城県<br>稲敷市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>新利根配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 1,924 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 30.5 | 11.0 | 20.0 | 12 | 29.5 | 10.5 | 19.4 | 12 | 29.5 | 9.5 | 18.4 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 088 茨城県<br>稲敷市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>桜川配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 1,194 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 088 茨城県<br>稲敷市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>東浄水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水・地下水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,411 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 089 茨城県<br>つくばみらい市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>久保浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水、県水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 3,427 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 24 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 32.5 | 11.0 | 20.9 | 12 | 28.5 | 10.5 | 19.3 | 12 | 32.0 | 11.3 | 20.3 | 24 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 089 茨城県<br>つくばみらい市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>谷和原浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水、県水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 2,537(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 089 茨城県<br>つくばみらい市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>みらい平配水場<br><br>[水源名]<br>県水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 090 茨城県<br>常総市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>石下東部浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 743(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | <0.0015 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | <0.0004 | 1 |
| トルエン | | | | | | | | | | | <0.020 | 1 |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | <0.008 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | <0.06 | 1 |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | <0.06 | 1 |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | 0.002 | 1 |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | 0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 24 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 12 | | | 0.8 | 1 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | 9.0 | 1 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | <0.030 | 1 |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | <0.002 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | 1.9 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | −1.5 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | 0 | 1 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | <0.0020 | 1 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | <0.000005 | 1 |
| 水温(℃) | 30.5 | 8.7 | 19.3 | 24 | 31.5 | 8.3 | 19.7 | 12 | 31.1 | 10.7 | 20.0 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 090 茨城県<br>常総市<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>石下西部浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,535 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 090 茨城県<br>常総市<br><br>[浄水場名] 02 － 02<br>相野谷浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,832 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 091 茨城県<br>行方市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>新原浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水、茨城県企業局鹿行より受水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 2,744 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0015 | 1 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 2 | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | | | | |
| トルエン | | | <0.020 | 1 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 2 | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | <0.008 | 1 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | | | | |
| 亜塩素酸 | | | <0.06 | 1 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2 | | | | |
| 二酸化塩素 | | | <0.06 | 1 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2 | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | 0.003 | 1 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 2 | | | | |
| 抱水クロラール | | | 0.003 | 1 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 2 | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | 9.0 | 1 | 10.0 | 5.0 | 7.5 | 2 | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | <0.030 | 1 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 2 | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | <0.002 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 2.7 | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 2 | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | −1.6 | 1 | −1.3 | −1.6 | −1.5 | 2 | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | <0.0020 | 1 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 2 | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | <0.000005 | 1 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | | | | |
| 水温(℃) | 31.5 | 6.4 | 18.8 | 12 | 31.5 | 10.0 | 19.7 | 24 | 29.5 | 12.0 | 20.1 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 091 茨城県<br>行方市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>行方浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 463(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 091 茨城県<br>行方市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>蔵川浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 77(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 091 茨城県<br>行方市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>井上浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 30.5 | 9.3 | 19.3 | 12 | 31.0 | 9.1 | 19.5 | 12 | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 091 茨城県<br>行方市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>手賀浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>08 － 091 茨城県<br>行方市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>谷島浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 887(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 091 茨城県<br>行方市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>中山浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 729(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | 31.5 | 8.5 | 19.7 | 12 | 29.5 | 9.5 | 19.1 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 091 茨城県<br>行方市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>上山浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 308 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 091 茨城県<br>行方市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>繁昌浄水場<br><br>[水源名]<br>茨城県企業局鹿行より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 347 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 091 茨城県<br>行方市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>山田浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0 (㎥)<br>休止中 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 12 | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 18.8 | 8.5 | 15.4 | 12 | 27.0 | 10.8 | 18.6 | 12 | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 091 茨城県<br>行方市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>泉配水場<br><br>[水源名]<br>茨城県企業局鹿行より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 2,131 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 091 茨城県<br>行方市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>次木配水場<br><br>[水源名]<br>茨城県企業局鹿行より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 1,853 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 092 茨城県<br>小美玉市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>小川浄水場<br><br>[水源名]<br>第6号深井戸水(他7水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 4,608 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 30.3 | 9.3 | 19.4 | 12 | 27.8 | 10.0 | 18.7 | 12 | 27.2 | 12.3 | 19.2 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 092 茨城県<br>小美玉市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>美野里浄水場<br><br>[水源名]<br>1系着水井(他2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 6,716 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 093 茨城県<br>筑西市<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>本城町浄水場<br><br>[水源名]<br>下館3号井・下館6号井・下館11号井・下館12号井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 5,056 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 093 茨城県<br>筑西市<br><br>[浄水場名] 01 － 02<br>折本配水場<br><br>[水源名]<br>鷹ノ巣浄水場から受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | <0.002 | 1 | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | <0.06 | 1 | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | <0.06 | 1 | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | <0.001 | 1 | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | <0.002 | 1 | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 12 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 378 | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | 4.1 | 1 | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | <0.5 | 1 | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | <1 | 1 | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | −1.0 | 1 | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | 0 | 1 | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | <0.000005 | 1 | | | | |
| 水温(℃) | 27.5 | 12.9 | 19.8 | 12 | 29.0 | 11.5 | 19.4 | 378 | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 093 茨城県<br>筑西市<br><br>[浄水場名] 01 － 03<br>玉戸浄水場<br><br>[水源名]<br>下館5号井・下館7号井・下館8号井・下館9号井・下館10号井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 7,174 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 093 茨城県<br>筑西市<br><br>[浄水場名] 01 － 04<br>鷹ノ巣浄水場<br><br>[水源名]<br>下館鷹ノ巣井・成田浄水場から受水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 407 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 093 茨城県<br>筑西市<br><br>[浄水場名] 01 － 05<br>成田浄水場<br><br>[水源名]<br>下館14号井・県西広域水道から受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 183 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | <0.06 | 1 | | | <0.06 | 1 | | | <0.06 | 1 |
| 二酸化塩素 | | | <0.06 | 1 | | | <0.06 | 1 | | | <0.06 | 1 |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 378 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 378 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 378 |
| 遊離炭酸 | | | 2.6 | 1 | | | 4.0 | 1 | | | 5.2 | 1 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 0.5 | 1 | | | 0.9 | 1 | | | 2.0 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | 1 | 1 | | | <1 | 1 | | | 2 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | −0.7 | 1 | | | −0.9 | 1 | | | −1.0 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | 3 | 1 | | | 0 | 1 | | | 0 | 1 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 |
| 水温(℃) | 30.0 | 10.0 | 19.3 | 378 | 29.0 | 11.5 | 19.7 | 378 | 31.0 | 11.0 | 20.0 | 378 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 093 茨城県<br>筑西市<br><br>[浄水場名] 01 － 06<br>川澄配水場<br><br>[水源名]<br>成田浄水場から受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 093 茨城県<br>筑西市<br><br>[浄水場名] 01 － 07<br>五所配水場<br><br>[水源名]<br>成田浄水場から受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 093 茨城県<br>筑西市<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>関城浄水場<br><br>[水源名]<br>関城1号井・関城2号井・県西広域水道から受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 910(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | <0.06 | 1 | | | <0.06 | 1 | | | <0.06 | 1 |
| 二酸化塩素 | | | <0.06 | 1 | | | <0.06 | 1 | | | <0.06 | 1 |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 378 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 378 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 378 |
| 遊離炭酸 | | | 4.4 | 1 | | | 3.0 | 1 | | | 4.3 | 1 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 1.8 | 1 | | | 2.5 | 1 | | | 2.2 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | 2 | 1 | | | 2 | 1 | | | 2 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | −0.9 | 1 | | | −0.8 | 1 | | | −1.0 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | 0 | 1 | | | 0 | 1 | | | 0 | 1 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 |
| 水温(℃) | 30.0 | 10.0 | 19.2 | 378 | 30.5 | 9.0 | 19.0 | 378 | 27.5 | 10.5 | 18.9 | 378 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 093 茨城県<br>筑西市<br><br>[浄水場名] 03 － 01<br>明野浄水場<br><br>[水源名]<br>明野1号井・明野2号井・明野3号井・県西広域水道から受水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 2,119 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 093 茨城県<br>筑西市<br><br>[浄水場名] 04 － 01<br>協和浄水場<br><br>[水源名]<br>協和1号井・協和3号井・協和4号井・県西広域水道から受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 755 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 093 茨城県<br>筑西市<br><br>[浄水場名] 04 － 02<br>小栗浄水場<br><br>[水源名]<br>小栗井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 537 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | <0.06 | 1 | | | <0.06 | 1 | | | <0.06 | 1 |
| 二酸化塩素 | | | <0.06 | 1 | | | <0.06 | 1 | | | <0.06 | 1 |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 378 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 378 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 378 |
| 遊離炭酸 | | | 4.9 | 1 | | | 5.6 | 1 | | | 5.0 | 1 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 1.8 | 1 | | | 2.2 | 1 | | | 0.5 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | 3 | 1 | | | 2 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | −0.9 | 1 | | | −1.0 | 1 | | | −0.9 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | 0 | 1 | | | 0 | 1 | | | 0 | 1 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 | | | 0.000019 | 1 |
| 水温(℃) | 27.0 | 11.5 | 19.1 | 378 | 28.0 | 12.5 | 19.7 | 378 | 30.0 | 10.5 | 19.6 | 378 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 093 茨城県<br>筑西市<br><br>[浄水場名] 04 － 03<br>蓬田浄水場<br><br>[水源名]<br>蓬田井<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 117 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 094 茨城県<br>城里町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>石塚浄水場<br><br>[水源名]<br>石塚系松山下取水場<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 2,469 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 094 茨城県<br>城里町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>小松浄水場<br><br>[水源名]<br>小松系小松導水場<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,736 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | <0.06 | 1 | | | <0.05 | 1 | | | <0.05 | 1 |
| 二酸化塩素 | | | <0.06 | 1 | | | <0.05 | 1 | | | <0.05 | 1 |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | 0.003 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 378 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | 3.7 | 1 | | | 3.3 | 1 | | | 1.8 | 1 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | <0.5 | 1 | | | 1.4 | 1 | | | 0.5 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | 2 | 1 | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | −0.8 | 1 | | | −1.4 | 1 | | | −1.2 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | 0 | 1 | | | <30 | 1 | | | 350 | 1 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | 0.000018 | 1 | | | 0.000003 | 1 | | | <0.000002 | 1 |
| 水温(℃) | 24.5 | 12.0 | 17.5 | 378 | 28.4 | 9.5 | 18.8 | 12 | 27.2 | 8.0 | 17.9 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 094 茨城県<br>城里町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>赤沢浄水場<br><br>[水源名]<br>赤沢系赤沢取水場<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,827 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 095 茨城県<br>笠間市<br><br>[浄水場名] 01 － 02<br>箱田配水池<br><br>[水源名]<br>県広域水道受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 6,878 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 095 茨城県<br>笠間市<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>宍戸浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 5,650 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.002 | 1 | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | <0.05 | 1 | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | <0.05 | 1 | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 365 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 365 |
| 遊離炭酸 | | | 5.7 | 1 | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | <0.2 | 1 | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | −2.2 | 1 | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | <30 | 1 | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | <0.000002 | 1 | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 25.0 | 11.4 | 17.8 | 12 | 24.0 | 9.5 | 17.1 | 12 | 28.0 | 13.0 | 17.4 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 095 茨城県<br>笠間市<br><br>[浄水場名] 02 － 02<br>高区配水池<br><br>[水源名]<br>県広域水道受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 4,474 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 095 茨城県<br>笠間市<br><br>[浄水場名] 02 － 03<br>低区配水池<br><br>[水源名]<br>県広域水道受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 4,474 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 095 茨城県<br>笠間市<br><br>[浄水場名] 03 － 01<br>吉岡浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,500 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 365 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 365 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 365 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 26.0 | 11.5 | 18.3 | 12 | 28.0 | 9.0 | 18.3 | 12 | 26.0 | 12.0 | 18.4 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 095 茨城県<br>笠間市<br><br>[浄水場名] 03 － 02<br>安居配水池<br><br>[水源名]<br>県広域水道受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 891 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 095 茨城県<br>笠間市<br><br>[浄水場名] 03 － 03<br>愛宕配水池<br><br>[水源名]<br>県広域水道受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 243 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 096 茨城県<br>常陸太田市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>瑞竜浄水場<br><br>[水源名]<br>茅根取水場(他3水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 15,169 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 3 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 3 |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 3 |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 3 |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 3 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 365 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 365 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 6 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 3 |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 3 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | <30 | <30 | <30 | 3 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 |
| 水温(℃) | 28.0 | 9.4 | 18.0 | 12 | 27.5 | 11.0 | 18.3 | 12 | 25.6 | 11.9 | 18.5 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 096 茨城県<br>常陸太田市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>新地浄水場<br><br>[水源名]<br>久慈川系・久慈川表流水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 825(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 096 茨城県<br>常陸太田市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>大野浄水場<br><br>[水源名]<br>久慈川系・山田川表流水<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 555(㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 096 茨城県<br>常陸太田市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>久米浄水場<br><br>[水源名]<br>久慈川系・山田川表流水<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 720(㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 3 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 2 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 2 |
| 二酸化塩素 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 2 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 2 |
| ジクロロアセトニトリル | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 3 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 2 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| 抱水クロラール | 0.006 | <0.003 | <0.003 | 3 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 2 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 2 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 3 | 5.3 | 3.5 | 4.4 | 2 | 5.1 | 4.4 | 4.8 | 2 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 3 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2 | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 2 |
| 臭気強度(TON) | 2 | <1 | 1 | 3 | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | <1 | <1 | 2 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | −0.1 | −1.0 | −0.4 | 3 | −0.8 | −1.0 | −0.9 | 2 | −0.1 | −0.1 | −0.1 | 2 |
| 従属栄養細菌 | <30 | <30 | <30 | 3 | <30 | <30 | <30 | 2 | <30 | <30 | <30 | 2 |
| 1,1－ジクロロエチレン | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 3 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | <0.000000 | <0.000000 | <0.000000 | 2 | 0.000002 | <0.000000 | 0.000001 | 2 |
| 水温(℃) | 29.0 | 10.0 | 19.2 | 12 | 28.5 | 9.8 | 19.2 | 12 | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 096 茨城県<br>常陸太田市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>内田浄水場<br><br>[水源名]<br>久慈川系・竜神ダム放流水<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 2,236 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 097 茨城県<br>鉾田市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>西台浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 435 (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>08 － 097 茨城県<br>鉾田市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>串挽浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,300 (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 2 | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 2 | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 2 | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | 7.3 | 4.2 | 5.8 | 2 | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 1.9 | 0.7 | 1.3 | 2 | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | <1 | <1 | <1 | 2 | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | −1.0 | −1.0 | −1.0 | 2 | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | <30 | <30 | <30 | 2 | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 2 | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | 25.5 | 11.5 | 22.7 | 12 | 28.0 | 10.0 | 19.0 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>08 － 097 茨城県<br>鉾田市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>旭浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>－<br><br>[浄水場名] －<br><br>[水源名]<br><br>[原水の種類]<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>給水栓水 | | | | [事業主体名]<br>－<br><br>[浄水場名] －<br><br>[水源名]<br><br>[原水の種類]<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>給水栓水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |