| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 001 千葉県<br>千葉県<br><br>[浄水場名] 03 － 01<br>柏井浄水場<br><br>[水源名]<br>利根川水系印旛沼<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 34,488 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 001 千葉県<br>千葉県<br><br>[浄水場名] 03 － 02<br>柏井浄水場<br><br>[水源名]<br>利根川水系利根川<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 245,000 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 001 千葉県<br>千葉県<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>北総浄水場<br><br>[水源名]<br>利根川水系利根川<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 89,641 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 4 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 4 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 4 |
| ウラン及びその化合物 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ニッケル及びその化合物 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 1,2－ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 |
| トルエン | <0.040 | <0.040 | <0.040 | 4 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | 4 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | 4 |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 抱水クロラール | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 農薬類 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 残留塩素 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 12 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 12 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 12 |
| 遊離炭酸 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 4 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 4 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 4 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 4 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 4 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 4 |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | <1 | <1 | <1 | 12 | <1 | <1 | <1 | 12 | <1 | <1 | <1 | 12 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | −0.9 | −1.2 | −1.1 | 4 | −0.9 | −1.2 | −1.1 | 4 | −1.0 | −1.4 | −1.2 | 4 |
| 従属栄養細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1,1－ジクロロエチレン | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 4 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 4 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 4 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.000003 | 0.000001 | 0.000002 | 4 | 0.000005 | 0.000002 | 0.000004 | 4 | 0.000005 | 0.000002 | 0.000004 | 4 |
| 水温(℃) | 30.0 | 7.6 | 18.5 | 12 | 31.0 | 6.9 | 18.3 | 12 | 31.8 | 6.8 | 18.1 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | 42.0 | 19.0 | 31.0 | 4 | 36.0 | 18.0 | 27.0 | 4 | 38.0 | 21.0 | 29.0 | 4 |
| 溶性ケイ酸 | 17.0 | 12.0 | 15.0 | 4 | 21.0 | 15.0 | 18.0 | 4 | 20.0 | 16.0 | 18.0 | 4 |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 001 千葉県<br>千葉県<br><br>[浄水場名] 10 － 02<br>姉崎分場<br><br>[水源名]<br>かずさ水道広域連合企業団より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 51,379 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 001 千葉県<br>千葉県<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>沼南給水場<br><br>[水源名]<br>北千葉広域水道企業団より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 189,881 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 001 千葉県<br>千葉県<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>福増浄水場<br><br>[水源名]<br>養老川水系高滝ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 60,367 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 4 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 4 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 4 |
| ウラン及びその化合物 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ニッケル及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 1,2－ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 |
| トルエン | <0.040 | <0.040 | <0.040 | 4 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | 4 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | 4 |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| 亜塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 抱水クロラール | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 農薬類 | | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 残留塩素 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 12 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 12 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | 14.0 | 6.0 | 10.0 | 4 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 4 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 4 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 4 |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | <1 | <1 | <1 | 12 | <1 | <1 | <1 | 12 | <1 | <1 | <1 | 12 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | −0.5 | −0.9 | −0.7 | 4 |
| 従属栄養細菌 | 20 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1,1－ジクロロエチレン | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 4 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 4 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 4 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | 0.000008 | 0.000005 | 0.000006 | 4 |
| 水温(℃) | 28.7 | 8.0 | 18.2 | 12 | 31.1 | 6.3 | 18.9 | 12 | 29.4 | 8.0 | 17.9 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | 40.0 | 20.0 | 29.0 | 4 | 35.0 | 25.0 | 31.0 | 4 | 56.0 | 26.0 | 36.0 | 4 |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | 31.0 | 23.0 | 27.0 | 4 |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 001 千葉県<br>千葉県<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>ちば野菊の里浄水場<br><br>[水源名]<br>利根川水系江戸川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 194,207(㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 002 千葉県<br>千葉市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>土気浄水場<br><br>[水源名]<br>土気4号井(土気5号井と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 239(㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 002 千葉県<br>千葉市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>平川浄水場<br><br>[水源名]<br>千葉県より浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 4 | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | | | | | | | | |
| トルエン | <0.040 | <0.040 | <0.040 | 4 | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4 | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | | | | | | |
| 農薬類 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 12 | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4 | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 4 | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | <1 | <1 | <1 | 12 | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | −1.0 | −1.5 | −1.2 | 4 | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 4 | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.000004 | <0.000001 | 0.000003 | 4 | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 30.4 | 7.7 | 18.3 | 12 | 21.5 | 14.0 | 17.8 | 2 | | | 16.5 | 1 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | 33.0 | 23.0 | 27.0 | 4 | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | 23.0 | 18.0 | 21.0 | 4 | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 002 千葉県<br>千葉市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>大木戸浄水場<br><br>[水源名]<br>千葉県より浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 002 千葉県<br>千葉市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>更科浄水場<br><br>[水源名]<br>更科1号井(更科2号井と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 606 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 002 千葉県<br>千葉市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>ちばリサーチパーク浄水場<br><br>[水源名]<br>ちばリサーチパーク1号井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 322 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | 22.5 | 1 | 20.0 | 14.0 | 17.0 | 2 | 17.0 | 15.2 | 16.1 | 2 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 003 千葉県<br>市原市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>永吉浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(市津第1井)＋養老川水系養老川<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>12 － 003 千葉県<br>市原市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>分目浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(海上第1井)＋養老川水系養老川<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 510 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 003 千葉県<br>市原市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>光風台浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(光風台第1井)＋養老川水系養老川<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 2,180 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 003 千葉県<br>市原市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>大蔵浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(牛久第4井)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 7(㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 003 千葉県<br>市原市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>鶴舞浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(鶴舞第1井)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,000(㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 003 千葉県<br>市原市<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>米原浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(平三第1井)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 223(㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 003 千葉県<br>市原市<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>平蔵浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(平三第2井)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 35(㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 003 千葉県<br>市原市<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>東部第2浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(東部第2井)＋養老川水系養老川<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 161(㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 003 千葉県<br>市原市<br><br>[浄水場名] 20 － 00<br>朝生原浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(南部第1井)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 167(㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 003 千葉県<br>市原市<br><br>[浄水場名] 21 － 00<br>国本浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(南部第2井)<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 335(㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 003 千葉県<br>市原市<br><br>[浄水場名] 22 － 00<br>万田野浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(南部第3井)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 37(㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 003 千葉県<br>市原市<br><br>[浄水場名] 23 － 00<br>新井浄水場<br><br>[水源名]<br>養老川水系養老川<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 11,264(㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 003 千葉県<br>市原市<br><br>[浄水場名] 24 － 00<br>月出浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(月出第1井)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 131 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 003 千葉県<br>市原市<br><br>[浄水場名] 25 － 00<br>潤井戸浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(潤井戸第1井)＋養老川水系養老川<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 830 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 003 千葉県<br>市原市<br><br>[浄水場名] 26 － 00<br>三和配水池<br><br>[水源名]<br>地下水(三和第3井)＋養老川水系養老川<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 2,605 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 003 千葉県<br>市原市<br><br>[浄水場名] 27 － 00<br>石塚浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(石塚第1井)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 8(㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 003 千葉県<br>市原市<br><br>[浄水場名] 28 － 00<br>市津配水池<br><br>[水源名]<br>地下水(三和第3井)＋養老川水系養老川<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 2,089(㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 003 千葉県<br>市原市<br><br>[浄水場名] 29 － 00<br>瀬又配水池<br><br>[水源名]<br>地下水(三和第3井)＋養老川水系養老川<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 960(㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 003 千葉県<br>市原市<br><br>[浄水場名] 30 － 00<br>牛久配水池<br><br>[水源名]<br>養老川水系養老川<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 4,156 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 004 千葉県<br>松戸市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>小金浄水場<br><br>[水源名]<br>北千葉より受水、小金地区7号井(他5水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,751 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 004 千葉県<br>松戸市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>大金平浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0 (㎥)<br>休止中 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 10 | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | 21.0 | 1 | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 004 千葉県<br>松戸市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>幸田配水場<br><br>[水源名]<br>北千葉より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 004 千葉県<br>松戸市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>常盤平浄水場<br><br>[水源名]<br>常盤平地区1号井(他7水源と混合)、北千葉より受水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 4,340 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 006 千葉県<br>習志野市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>第1給水場<br><br>[水源名]<br>地下水・北千葉広域水道企業団から受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,826 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | 0.007 | 1 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | 0.003 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | −0.7 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 9 | | | | |
| 水温(℃) | | | 26.0 | 1 | | | 23.5 | 1 | 27.0 | 10.0 | 18.5 | 2 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 006 千葉県<br>習志野市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>第2給水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 8,522 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 010 千葉県<br>野田市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>上花輪浄水場<br><br>[水源名]<br>江戸川・北千葉広域水道企業団より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 13,637 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 010 千葉県<br>野田市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>東金野井浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸・北千葉広域水道企業団より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 10,643 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.002 | 1 | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | 0.002 | 1 | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | 0.002 | 1 | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | −0.2 | 1 | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | 260 | 1 | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 22.0 | 13.0 | 17.5 | 2 | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 010 千葉県<br>野田市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>中根配水場<br><br>[水源名]<br>北千葉広域水道企業団より受水・上花輪浄水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 12,322 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 010 千葉県<br>野田市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>木間ヶ瀬浄水場<br><br>[水源名]<br>北千葉広域水道企業団より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 5,558 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 011 千葉県<br>柏市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>第一水源地<br><br>[水源名]<br>現在休止中<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0 (㎥)<br>休止中 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 011 千葉県<br>柏市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>第三水源地<br><br>[水源名]<br>北千葉広域水道より受水・深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 33,860 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 011 千葉県<br>柏市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>第四水源地<br><br>[水源名]<br>北千葉広域水道より受水・深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 19,194 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 011 千葉県<br>柏市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>第五水源地<br><br>[水源名]<br>北千葉広域水道より受水・深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 21,795 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | 0.8 | 1 | | | 0.4 | 1 | | | 0.7 | 1 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | 28.5 | 1 | | | 30.0 | 1 | | | 30.5 | 1 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | 47.4 | 1 | | | 47.2 | 1 | | | 44.2 | 1 |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | 29.0 | 1 | | | 27.0 | 1 | | | 29.0 | 1 |
| 溶性ケイ酸 | | | 29.3 | 1 | | | 26.8 | 1 | | | 24.3 | 1 |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 011 千葉県<br>柏市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>第六水源地<br><br>[水源名]<br>北千葉広域水道より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 27,754 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 011 千葉県<br>柏市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>岩井水源地<br><br>[水源名]<br>北千葉広域水道より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 13,002 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 012 千葉県<br>流山市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>東部浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,614 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | <0.000005 | 1 |
| 水温(℃) | | | | | | | | | 22.5 | 14.5 | 19.0 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 012 千葉県<br>流山市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>江戸川台浄水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水＋深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 13,060 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 012 千葉県<br>流山市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>西平井浄水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水＋深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 18,015 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 012 千葉県<br>流山市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>おおたかの森浄水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水＋深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 21,249 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 12 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 12 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 |
| 水温(℃) | 29.0 | 12.0 | 19.3 | 12 | 31.3 | 6.5 | 18.4 | 12 | 28.0 | 8.7 | 17.8 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 013 千葉県<br>八千代市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>萱田浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸・睦浄水場より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,156 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 013 千葉県<br>八千代市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>八千代台浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸・睦浄水場より受水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 5,773 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 013 千葉県<br>八千代市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>勝田台浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸・睦浄水場より受水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 2,569 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 364 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 364 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 364 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 24.1 | 11.2 | 17.7 | 2 | 19.5 | 14.2 | 16.9 | 2 | 18.3 | 14.1 | 16.2 | 2 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 013 千葉県<br>八千代市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>米本浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸・睦浄水場より受水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 3,723 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 013 千葉県<br>八千代市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>高津浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸・睦浄水場より受水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 5,266 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 013 千葉県<br>八千代市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>睦浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸・北千葉広域水道企業団より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,225 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 364 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 364 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 364 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 18.4 | 15.5 | 17.0 | 2 | 22.0 | 13.2 | 17.6 | 2 | 28.3 | 8.2 | 18.3 | 2 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 014 千葉県<br>我孫子市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>湖北台浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,529 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 014 千葉県<br>我孫子市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>久寺家浄水場<br><br>[水源名]<br>北千葉から浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 014 千葉県<br>我孫子市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>妻子原浄水場<br><br>[水源名]<br>北千葉から浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 2 | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | | | | | | | | |
| トルエン | <0.040 | <0.040 | <0.040 | 2 | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 12 | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 2 | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 2 | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | <1 | <1 | <1 | 2 | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | −0.8 | −0.8 | −0.8 | 2 | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | 18 | 0 | 9 | 2 | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 2 | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 26.0 | 10.0 | 18.1 | 12 | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>中台浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水、用水供給事業より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 17,130 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>上烏田浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水、用水供給事業より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 14,748 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>富来田第1浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 809 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>伊豆島配水場<br><br>[水源名]<br>用水供給事業より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 6,946 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>富来田第2浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 396 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>かずさ配水場(木更津市域)<br><br>[水源名]<br>用水供給事業より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 1,479 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>金田配水場<br><br>[水源名]<br>用水供給事業より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 2,527 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>久保浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,674 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>北子安配水場<br><br>[水源名]<br>用水供給事業より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 16,093 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>宮下浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 827(㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>皿引浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 216(㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>小糸大谷浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 315(㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>小糸浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水、用水供給事業より受水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 511 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>鎌滝浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(浄水と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 123 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>清和市場浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(浄水と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 221 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>東日笠配水場<br><br>[水源名]<br>地下水(浄水と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 298(㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>市場浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 265(㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>俵田浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 764(㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 19 － 00<br>川谷浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 109 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 20 － 00<br>愛宕浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(浄水と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 622 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 21 － 00<br>山滝野浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(浄水と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 417 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 22 － 00<br>大戸見浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 809(㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 23 － 00<br>坂畑浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(浄水と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 229(㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 24 － 00<br>蔵玉浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(浄水と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 90(㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 25 － 00<br>かずさ配水場(君津市域)<br><br>[水源名]<br>用水供給事業より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 2,289 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 26 － 00<br>亀田浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,386 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 27 － 00<br>宝竜寺受水槽<br><br>[水源名]<br>用水供給事業より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 4,847 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 28 － 00<br>永吉浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,021 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 29 － 00<br>代宿浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 724 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 30 － 00<br>勝下浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,120 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 31 － 00<br>角山配水場<br><br>[水源名]<br>用水供給事業より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 14,759 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 028 千葉県<br>かずさ水道広域連合企業団<br><br>[浄水場名] 32 － 00<br>吉野田配水場<br><br>[水源名]<br>用水供給事業より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 1,464 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 031 千葉県<br>成田市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>東町配水場<br><br>[水源名]<br>東町1号井～3号井・5号井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,013 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 031 千葉県<br>成田市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>並木町配水場<br><br>[水源名]<br>並木町1号井～5号井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 3,768 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 031 千葉県<br>成田市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>三里塚配水場<br><br>[水源名]<br>三里塚1号井～3号井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,516 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 031 千葉県<br>成田市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>宗吾配水場<br><br>[水源名]<br>宗吾1号井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 222 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 031 千葉県<br>成田市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>飯田町配水場<br><br>[水源名]<br>飯田町1号井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,299 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 031 千葉県<br>成田市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>東和田配水場<br><br>[水源名]<br>東和田1号井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,065 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 031 千葉県<br>成田市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>山口配水場<br><br>[水源名]<br>用水供給事業からの浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 4,641 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 033 千葉県<br>佐倉市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>南部浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水、印旛広域より受水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 18,392 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 033 千葉県<br>佐倉市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>志津浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水、印旛広域より受水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 25,749 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 033 千葉県<br>佐倉市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>上座浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,424 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 4 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 4 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 4 |
| ウラン及びその化合物 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ニッケル及びその化合物 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 1,2－ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 |
| トルエン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 4 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 4 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 4 |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | 10 | 0 | 3 | 4 | 87 | 0 | 22 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 |
| 1,1－ジクロロエチレン | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 4 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 4 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 4 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 25.5 | 10.0 | 16.8 | 4 | 21.5 | 12.1 | 16.3 | 4 | 20.5 | 13.0 | 16.4 | 4 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | 23.0 | 15.0 | 20.0 | 4 | 14.0 | 10.0 | 12.0 | 4 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 4 |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 034 千葉県<br>四街道市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>第1浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 8,463 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 034 千葉県<br>四街道市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>第2浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水、印旛広域より受水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 5,208 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 034 千葉県<br>四街道市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>第3浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水、印旛広域より受水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 8,285 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 365 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 365 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 365 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 035 千葉県<br>酒々井町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>尾上浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水、印旛広域より受水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 5,903 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 036 千葉県<br>八街市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>八街市大木配水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,519 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 036 千葉県<br>八街市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>八街市榎戸配水場<br><br>[水源名]<br>地下水、印旛企業団より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 8,285 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 037 千葉県<br>富里市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>富里市浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水、印旛広域より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 5,392 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 038 千葉県<br>印西市(印西)<br><br>[浄水場名] 04 － 01<br>平岡配水場<br><br>[水源名]<br>地下水及び受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,659 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 038 千葉県<br>印西市(印西)<br><br>[浄水場名] 05 － 01<br>印旛配水場<br><br>[水源名]<br>地下水及び受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 888 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.002 | 1 | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | −0.4 | 1 | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | 63 | 1 | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | <0.000005 | 1 | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 039 千葉県<br>長門川水道企業団<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>上前浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(1号井戸)＋利根川水系(長門川)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 5,060(㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 039 千葉県<br>長門川水道企業団<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>前新田浄水場<br><br>[水源名]<br>利根川水系(長門川)<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 5,295(㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 039 千葉県<br>長門川水道企業団<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>酒直配水場<br><br>[水源名]<br>浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 1,367(㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| 抱水クロラール | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 2 |
| 農薬類 | | | | | | | 0.00 | 1 | | | | |
| 残留塩素 | | | | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 12 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | 6.0 | 4.4 | 5.2 | 2 | 4.0 | 3.4 | 3.7 | 2 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 2 |
| 臭気強度(TON) | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | <1 | <1 | 2 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | −0.5 | −0.7 | −0.6 | 2 | −0.6 | −1.0 | −0.8 | 2 |
| 従属栄養細菌 | | | | | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | <1 | <1 | 12 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | 0.000004 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | | | | |
| 水温(℃) | | | | | 32.0 | 6.1 | 19.1 | 12 | 30.0 | 8.5 | 18.9 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | 99.1 | 45.0 | 70.2 | 365 | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 040 千葉県<br>白井市<br><br>[浄水場名] 01 － 03<br>白井配水場<br><br>[水源名]<br>印広水供給浄水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 4,850 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 050 千葉県<br>香取市(佐原)<br><br>[浄水場名] 00 － 00<br>みずほ台浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸(他1深井戸と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 335 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 050 千葉県<br>香取市(佐原)<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>佐原浄水場<br><br>[水源名]<br>利根川水系利根川<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 4,052 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | <0.0020 | 1 | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | 0.0006 | 1 | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | <0.002 | 1 | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | <0.0004 | 1 | | | | |
| トルエン | | | | | | | <0.040 | 1 | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | <0.008 | 1 | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | <0.06 | 1 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2 |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| 抱水クロラール | | | | | | | <0.002 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| 農薬類 | | | | | | | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| 残留塩素 | | | | | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 12 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 9 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | 19.0 | 1 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 2 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | <0.030 | 1 | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | <0.002 | 1 | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | 1.0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 2 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | −0.8 | 1 | −1.2 | −1.3 | −1.3 | 4 |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | <0.0100 | 1 | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | <0.000005 | 1 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 4 |
| 水温(℃) | | | | | 19.5 | 15.8 | 17.5 | 12 | 31.5 | 8.3 | 20.4 | 9 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 050 千葉県<br>香取市(佐原)<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>玉造浄水場<br><br>[水源名]<br>利根川水系利根川(他1深井戸と混合)<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流・表流水(自流)・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,267 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 052 千葉県<br>香取市(小見川・山田)<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>城山第2浄水場<br><br>[水源名]<br>利根川水系利根川(利根川水系清水川と混合)(着水井)<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流・ダム直接・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 10,800 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 053 千葉県<br>多古町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>多古浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,692 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2 | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | |
| 抱水クロラール | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | | | | |
| 農薬類 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | | | | |
| 残留塩素 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 9 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 12 | | | | |
| 遊離炭酸 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 2 | 9.0 | 6.0 | 7.5 | 2 | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 2 | 2.8 | 1.0 | 1.9 | 12 | | | | |
| 臭気強度(TON) | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | <1 | <1 | 2 | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | −1.2 | −1.3 | −1.3 | 4 | −1.2 | −1.4 | −1.3 | 2 | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 4 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 4 | | | | |
| 水温(℃) | 29.8 | 8.5 | 19.8 | 9 | 31.8 | 7.4 | 19.5 | 12 | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 053 千葉県<br>多古町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>中浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 300(㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 053 千葉県<br>多古町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>東條浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 190(㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 053 千葉県<br>多古町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>常磐浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 392(㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 053 千葉県<br>多古町<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>久賀浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,447 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 054 千葉県<br>神崎町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>古原浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(1，2，3号井)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 443 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 054 千葉県<br>神崎町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>第二浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 1,057 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 365 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 365 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | 25.9 | 8.6 | 17.3 | 365 | 29.1 | 7.9 | 18.6 | 365 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 060 千葉県<br>銚子市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>本城浄水場<br><br>[水源名]<br>利根川水系高田川・黒部川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 19,892 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 060 千葉県<br>銚子市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>諸持町受水配水地<br><br>[水源名]<br>銚子市水道事業 東総広域水道企業団<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 4,583 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 061 千葉県<br>東庄町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>新堀配水場<br><br>[水源名]<br>東総広域水道企業団より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 4 | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | | | | | | | | |
| トルエン | <0.040 | <0.040 | <0.040 | 4 | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 4 | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | 0.00 | 1 | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 365 | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | 6.4 | 4.4 | 5.5 | 4 | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 4 | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 4 | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | <1 | <1 | <1 | 4 | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | −0.7 | −1.3 | −1.0 | 4 | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | 1 | 0 | 0 | 4 | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 4 | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.000012 | 0.000004 | 0.000007 | 4 | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 28.4 | 8.8 | 18.6 | 12 | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | 61.1 | 43.2 | 49.8 | 12 | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 062 千葉県<br>旭市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>旭市配水場<br><br>[水源名]<br>東総広域水道企業団より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 16,324 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 066 千葉県<br>東庄町(第2)<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>小南配水場<br><br>[水源名]<br>東総広域水道企業団より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 070 千葉県<br>八匝水道企業団<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>八日市場配水場<br><br>[水源名]<br>九十九里地域水道企業団より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 11,259 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 071 千葉県<br>山武郡市広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>大網配水場<br><br>[水源名]<br>九十九里地域水道企業団より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 15,124 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 071 千葉県<br>山武郡市広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>松尾配水場<br><br>[水源名]<br>九十九里地域水道企業団より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 6,896 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 071 千葉県<br>山武郡市広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>東金配水場<br><br>[水源名]<br>九十九里地域水道企業団より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 26,684 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 072 千葉県<br>長生郡市広域市町村圏組合<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>山之郷浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,410 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 072 千葉県<br>長生郡市広域市町村圏組合<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>皿木浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 5,453 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 072 千葉県<br>長生郡市広域市町村圏組合<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>長南浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,050 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 2 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 2 | | | <0.05 | 1 |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | 0.001 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 2 | | | 0.8 | 1 |
| 遊離炭酸 | 9.6 | 5.8 | 7.7 | 2 | 10.0 | 3.4 | 6.7 | 2 | | | 2.9 | 1 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | −0.8 | −0.8 | −0.8 | 2 | −0.1 | −0.8 | −0.5 | 2 | | | 0.0 | 1 |
| 従属栄養細菌 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 2 | 7 | 2 | | | 2 | 1 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 072 千葉県<br>長生郡市広域市町村圏組合<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>真名配水場<br><br>[水源名]<br>九十九里地域水道企業団より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 29,878 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 072 千葉県<br>長生郡市広域市町村圏組合<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>大沢配水場<br><br>[水源名]<br>九十九里地域水道企業団より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 13,127 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 073 千葉県<br>山武市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>山武浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,850 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | 52 | 0 | 5 | 12 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 080 千葉県<br>勝浦市<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>鵜原配水場<br><br>[水源名]<br>利根川水系房総導水路－大多喜浄水場<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 2,210 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 080 千葉県<br>勝浦市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>佐野浄水場<br><br>[水源名]<br>夷隅川水系夷隅川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 5,199 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 080 千葉県<br>勝浦市<br><br>[浄水場名] 05 － 01<br>上植野配水場<br><br>[水源名]<br>利根川水系房総導水路－大多喜浄水場<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 602 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 082 千葉県<br>大多喜町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>面白浄水場<br><br>[水源名]<br>養老川水系養老川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 650(㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 082 千葉県<br>大多喜町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>横山浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(第1、2、3号井)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 594(㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 082 千葉県<br>大多喜町<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>大多喜配水場<br><br>[水源名]<br>受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 1,277(㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 082 千葉県<br>大多喜町<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>八声配水場<br><br>[水源名]<br>受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 576 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 083 千葉県<br>いすみ市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>大野浄水場<br><br>[水源名]<br>夷隅川水系大野川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 2,248 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 083 千葉県<br>いすみ市<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>須賀谷配水池<br><br>[水源名]<br>南房総広域水道企業団(利根川水系)より100%受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 980 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 2 | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 2 | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 365 | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 2 | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2 | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | −0.9 | −1.0 | −1.0 | 2 | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | 0.000011 | 0.000009 | 0.000010 | 2 | | | | |
| 水温(℃) | | | | | 19.5 | 6.9 | 13.4 | 12 | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 083 千葉県<br>いすみ市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>山田浄水場<br><br>[水源名]<br>夷隅川水系上山田川<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 1,002 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 083 千葉県<br>いすみ市<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>大原配水場<br><br>[水源名]<br>南房総広域水道企業団(利根川水系)より100%受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 2,996 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 083 千葉県<br>いすみ市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>音羽浄水場<br><br>[水源名]<br>夷隅川水系海老川<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 1,831 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 2 | | | | | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 2 |
| 抱水クロラール | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 2 | | | | | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 2 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 365 | | | | | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 365 |
| 遊離炭酸 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 2 | | | | | 4.8 | 4.1 | 4.5 | 2 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2 | | | | | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2 |
| 臭気強度(TON) | <1 | <1 | <1 | 2 | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | −1.9 | −2.1 | −2.0 | 2 | | | | | −1.2 | −1.3 | −1.3 | 2 |
| 従属栄養細菌 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.000011 | 0.000009 | 0.000010 | 2 | | | | | 0.000007 | 0.000005 | 0.000006 | 2 |
| 水温(℃) | 18.8 | 6.4 | 13.6 | 12 | | | | | 28.5 | 7.4 | 17.5 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 084 千葉県<br>御宿町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>御宿町浄水場<br><br>[水源名]<br>夷隅川水系上落合川<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 2,186(㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 092 千葉県<br>鴨川市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>江見浄水場<br><br>[水源名]<br>洲貝川水系洲貝川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>12 － 092 千葉県<br>鴨川市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>東町浄水場<br><br>[水源名]<br>ニタ間川水系袋倉川<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 3,007(㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 2 | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | 0.010 | 0.002 | 0.006 | 2 | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 14 | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | 19.0 | 6.0 | 12.5 | 2 | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 2 | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | 6 | 1 | 3 | 8 | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | −2.4 | −2.9 | −2.7 | 2 | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.000017 | 0.000006 | 0.000012 | 2 | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 092 千葉県<br>鴨川市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>横渚浄水場<br><br>[水源名]<br>待崎川水系待崎川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 3,379 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 092 千葉県<br>鴨川市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>高鶴配水場<br><br>[水源名]<br>南房総広域水道企業団より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 1,409 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 092 千葉県<br>鴨川市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>保台浄水場<br><br>[水源名]<br>待崎川水系上待崎川<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 4,935 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 092 千葉県<br>鴨川市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>奥谷浄水場<br><br>[水源名]<br>大風沢川<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 1,201(㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 092 千葉県<br>鴨川市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>坂本浄水場<br><br>[水源名]<br>二タ間川<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>12 － 092 千葉県<br>鴨川市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>石上配水場<br><br>[水源名]<br>南房総広域水道企業団より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 1,786(㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 092 千葉県<br>鴨川市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>清澄浄水場<br><br>[水源名]<br>大降り東水源地<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 33 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 093 千葉県<br>南房総市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>小向浄水場<br><br>[水源名]<br>三原川水系三原川小向ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 5,042 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 093 千葉県<br>南房総市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>千倉第2配水池<br><br>[水源名]<br>南房総広域水道企業団より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 2,086 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | | | | |
| トルエン | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 2 | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 365 | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | 10.0 | 8.8 | 9.4 | 2 | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | 28.2 | 7.8 | 17.5 | 12 | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | 63.2 | 43.1 | 52.2 | 4 | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 093 千葉県<br>南房総市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>白浜浄水場<br><br>[水源名]<br>長尾川水系長尾川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 1,880(㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 093 千葉県<br>南房総市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>白浜浄水場<br><br>[水源名]<br>長尾川水系馬喰川白浜ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 1,880(㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 093 千葉県<br>南房総市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>富山浄水場<br><br>[水源名]<br>平久里川水系大谷川<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 867(㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 093 千葉県<br>南房総市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>第6配水場<br><br>[水源名]<br>南房総広域水道企業団より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 1,555 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 094 千葉県<br>鋸南町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>鋸南町浄水場<br><br>[水源名]<br>元名川水系元名川<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 1,898 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 094 千葉県<br>鋸南町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>湯沢配水場<br><br>[水源名]<br>南房総広域水道企業団<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 1,104 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 2 | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | 11.0 | 6.0 | 8.5 | 2 | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | <1 | <1 | <1 | 4 | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | −0.5 | −0.8 | −0.7 | 2 | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | 4 | 0 | 2 | 4 | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | 0.000006 | 1 | | | | |
| 水温(℃) | | | | | 23.1 | 9.9 | 16.0 | 12 | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 097 千葉県<br>三芳水道企業団<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>宮城浄水場<br><br>[水源名]<br>蟹田川水系蟹田川<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>12 － 097 千葉県<br>三芳水道企業団<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>見物浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(2～4号井)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>12 － 097 千葉県<br>三芳水道企業団<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>神余浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(2、6号井)<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 097 千葉県<br>三芳水道企業団<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>佐野浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(1、2、4、5号井)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>12 － 097 千葉県<br>三芳水道企業団<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>山本浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(2～5、8号井)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,157 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 097 千葉県<br>三芳水道企業団<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>真倉浄水場<br><br>[水源名]<br>斜坑<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | 0.0011 | 0.0008 | 0.0010 | 4 | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 12 | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | 19.4 | 16.1 | 17.5 | 12 | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 097 千葉県<br>三芳水道企業団<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>増間浄水場<br><br>[水源名]<br>平久里川水系増間川<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 3,055 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 097 千葉県<br>三芳水道企業団<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>作名浄水場<br><br>[水源名]<br>汐入川水系作名川<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 3,948 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>12 － 097 千葉県<br>三芳水道企業団<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>出野尾配水場<br><br>[水源名]<br>南房総水道企業団より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 7,265 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 12 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 12 | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 27.7 | 7.1 | 16.8 | 12 | 29.0 | 8.0 | 18.2 | 12 | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>12 － 097 千葉県<br>三芳水道企業団<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>宮本配水場<br><br>[水源名]<br>南房総水道企業団より受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 4,807 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>－<br><br>[浄水場名] －<br><br>[水源名]<br><br>[原水の種類]<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>－<br><br>[浄水場名] －<br><br>[水源名]<br><br>[原水の種類]<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | | | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |