| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>百笑<br><br>[水源名]<br>百笑<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 8,067(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>具同<br><br>[水源名]<br>具同<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 3,362(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>大用<br><br>[水源名]<br>大用<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 63(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 34.0 | 8.0 | 23.8 | 12 | 33.0 | 9.0 | 21.5 | 12 | 27.8 | 7.8 | 17.8 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>川登<br><br>[水源名]<br>川登<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 67(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>鵜ノ江<br><br>[水源名]<br>鵜ノ江<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 35(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>岩田<br><br>[水源名]<br>岩田<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 52(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 28.9 | 6.9 | 18.1 | 12 | 33.5 | 5.0 | 19.2 | 12 | 30.5 | 6.9 | 18.4 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>後川<br><br>[水源名]<br>後川<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 53 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>蕨岡<br><br>[水源名]<br>蕨岡<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 149 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>佐田<br><br>[水源名]<br>佐田<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 59 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 36.5 | 5.0 | 19.3 | 12 | 32.2 | 5.0 | 17.3 | 12 | 29.4 | 6.7 | 18.3 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>実崎<br><br>[水源名]<br>実崎<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 188 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>間崎<br><br>[水源名]<br>間崎<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 140 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>名鹿<br><br>[水源名]<br>名鹿<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 34 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 31.0 | 9.0 | 19.8 | 12 | 31.0 | 9.0 | 19.3 | 12 | 28.0 | 9.0 | 19.1 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>初崎<br><br>[水源名]<br>初崎<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 33(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>有岡<br><br>[水源名]<br>有岡<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 550(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>森沢<br><br>[水源名]<br>森沢<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 54(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 29.0 | 9.0 | 19.2 | 12 | 29.0 | 9.0 | 18.7 | 12 | 27.0 | 11.0 | 19.0 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>江川崎<br><br>[水源名]<br>江川崎<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 124(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>口屋内<br><br>[水源名]<br>口屋内<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 38(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>長生<br><br>[水源名]<br>長生<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 19(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 28.0 | 7.0 | 18.4 | 12 | 28.0 | 0.0 | 13.8 | 12 | 27.0 | 8.0 | 18.0 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 19 － 00<br>藤ノ川<br><br>[水源名]<br>藤ノ川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 36(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 20 － 00<br>下方<br><br>[水源名]<br>下方<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 77(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 21 － 00<br>橘・津野川<br><br>[水源名]<br>橘・津野川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 56(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 26.2 | 7.1 | 17.1 | 12 | 29.9 | 7.1 | 19.7 | 12 | 34.5 | 9.5 | 22.1 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 22 － 00<br>奥屋内<br><br>[水源名]<br>奥屋内<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 13(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 23 － 00<br>江川・半家<br><br>[水源名]<br>江川・半家<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 72(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 24 － 00<br>岩間<br><br>[水源名]<br>岩間<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 18(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 21.0 | 2.0 | 12.9 | 12 | 34.0 | 5.0 | 20.7 | 12 | 35.0 | 1.0 | 17.1 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 25 － 00<br>大宮<br><br>[水源名]<br>大宮<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 146(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 25 － 01<br>大宮2<br><br>[水源名]<br>大宮<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 146(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 26 － 00<br>権谷<br><br>[水源名]<br>権谷<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 30(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 32.8 | 8.9 | 20.9 | 12 | 32.1 | 7.4 | 20.6 | 12 | 30.0 | 3.0 | 16.9 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 27 － 00<br>奥屋内下<br><br>[水源名]<br>奥屋内下<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 16(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 28 － 00<br>用井<br><br>[水源名]<br>用井<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 182(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 29 － 00<br>方ノ川<br><br>[水源名]<br>方ノ川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 21(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 23.0 | 3.0 | 13.3 | 12 | 26.0 | 7.0 | 17.5 | 12 | 29.4 | 5.2 | 19.8 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 30 － 00<br>黒尊<br><br>[水源名]<br>黒尊<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 1(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 31 － 00<br>大防<br><br>[水源名]<br>大防<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 11(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 32 － 00<br>本村・半家<br><br>[水源名]<br>本村・半家<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 14(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 21.0 | 2.0 | 12.4 | 12 | 26.7 | 7.1 | 18.1 | 12 | 27.0 | 7.0 | 17.6 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 33 － 00<br>押谷<br><br>[水源名]<br>押谷<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 10(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 34 － 00<br>玖木<br><br>[水源名]<br>玖木<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 6(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 35 － 00<br>中半<br><br>[水源名]<br>中半<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 12(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 36.0 | 3.0 | 19.6 | 12 | 23.0 | 3.0 | 13.8 | 12 | 29.0 | 0.0 | 14.2 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 36 － 00<br>深瀬<br><br>[水源名]<br>深瀬<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 4(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 37 － 00<br>津賀<br><br>[水源名]<br>津賀<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 17(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 001 高知県<br>四万十市<br><br>[浄水場名] 38 － 00<br>一ノ又<br><br>[水源名]<br>一ノ又<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 9(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 27.0 | 0.0 | 12.6 | 12 | 34.2 | 6.3 | 21.2 | 12 | 29.1 | 7.9 | 19.2 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 002 高知県<br>高知市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>旭浄水場<br><br>[水源名]<br>鏡川<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 39,702 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 002 高知県<br>高知市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>針木浄水場<br><br>[水源名]<br>仁淀川・鏡川<br><br>[原水の種類]<br>伏流水・ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 49,487 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 002 高知県<br>高知市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>本宮町水源<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,844 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| ウラン及びその化合物 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| ニッケル及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 1,2－ジクロロエタン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| トルエン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| 抱水クロラール | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| 農薬類 | * <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | * <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | * <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | 2.6 | 1.8 | 2.4 | 4 | 3.5 | 1.8 | 2.6 | 4 | 3.5 | 1.8 | 2.4 | 4 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | −1.2 | −1.5 | −1.3 | 4 | −1.2 | −1.5 | −1.3 | 4 | −1.2 | −1.3 | −1.3 | 4 |
| 従属栄養細菌 | 2 | <1 | <1 | 12 | 3 | <1 | <1 | 12 | 2 | <1 | <1 | 12 |
| 1,1－ジクロロエチレン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 |
| 水温(℃) | 26.5 | 10.1 | 17.8 | 12 | 30.9 | 11.6 | 20.8 | 12 | 25.3 | 11.7 | 18.0 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | * 1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | * 1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | | | | |
| アルカリ度 | 41.0 | 33.0 | 38.5 | 4 | 39.0 | 32.0 | 35.3 | 4 | 40.0 | 34.0 | 38.3 | 4 |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | 5.3 | 3.7 | 4.3 | 12 | 6.1 | 4.3 | 5.1 | 12 | 5.2 | 3.8 | 4.3 | 12 |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 002 高知県<br>高知市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>布師田水源<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,021 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 002 高知県<br>高知市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>弘岡上水源<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,997 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 002 高知県<br>高知市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>森山水源<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,485 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| ウラン及びその化合物 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| ニッケル及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 1,2－ジクロロエタン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| トルエン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| 抱水クロラール | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| 農薬類 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | 20.2 | 12.3 | 15.1 | 12 | 6.2 | 4.4 | 5.3 | 4 | 18.5 | 13.2 | 15.2 | 4 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | −1.6 | −1.7 | −1.6 | 4 | −1.6 | −1.7 | −1.6 | 4 | −1.3 | −1.6 | −1.4 | 4 |
| 従属栄養細菌 | 4 | <1 | <1 | 12 | 4 | <1 | 1 | 12 | 1 | <1 | <1 | 12 |
| 1,1－ジクロロエチレン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | 0.000013 | <0.000005 | 0.000010 | 4 |
| 水温(℃) | 19.3 | 16.8 | 18.2 | 12 | 22.2 | 14.7 | 18.0 | 12 | 30.3 | 12.2 | 19.9 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | 63.0 | 58.0 | 60.5 | 4 | 40.0 | 36.0 | 38.0 | 4 | 61.0 | 56.0 | 58.8 | 4 |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | 7.3 | 6.7 | 7.1 | 12 | 6.8 | 4.7 | 5.9 | 12 | 17.7 | 6.7 | 12.7 | 12 |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 002 高知県<br>高知市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>鏡小浜浄水場<br><br>[水源名]<br>鏡川水系吉原川<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 161(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 002 高知県<br>高知市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>土佐山弘瀬浄水場<br><br>[水源名]<br>鏡川水系普通河川水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 27(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 002 高知県<br>高知市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>土佐山平石浄水場<br><br>[水源名]<br>鏡川水系普通河川水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 44(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| ウラン及びその化合物 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| ニッケル及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 1,2－ジクロロエタン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| トルエン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| 抱水クロラール | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| 農薬類 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 12 |
| 遊離炭酸 | 1.8 | <0.9 | 1.4 | 4 | 3.5 | 1.8 | 2.6 | 4 | 1.8 | <0.9 | 0.9 | 4 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | −0.9 | −1.2 | −1.0 | 4 | −1.5 | −1.8 | −1.6 | 4 | −1.3 | −1.9 | −1.6 | 4 |
| 従属栄養細菌 | 3 | <1 | 1 | 12 | 6 | <1 | 2 | 12 | 5 | <1 | 1 | 12 |
| 1,1－ジクロロエチレン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 |
| 水温(℃) | 26.9 | 7.4 | 17.4 | 12 | 26.3 | 7.9 | 17.6 | 12 | 26.1 | 6.8 | 16.7 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | 44.0 | 35.0 | 40.8 | 4 | 37.0 | 26.0 | 31.8 | 4 | 32.0 | 21.0 | 26.8 | 4 |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | 5.5 | 2.7 | 3.8 | 12 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 12 | 3.5 | 2.1 | 2.6 | 12 |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 002 高知県<br>高知市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>行川吉井浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 7(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 002 高知県<br>高知市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>領家浄水場<br><br>[水源名]<br>鏡川水系普通河川水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 14(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 003 高知県<br>須崎市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>上分笹野<br><br>[水源名]<br>上分笹野<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 78(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | | | | |
| ウラン及びその化合物 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | | | |
| トルエン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | 1.8 | <0.9 | <0.9 | 4 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | 4 | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | −0.5 | −0.8 | −0.6 | 4 | −0.1 | −0.3 | −0.2 | 4 | | | −0.4 | 1 |
| 従属栄養細菌 | 11 | <1 | 5 | 12 | 9 | <1 | 3 | 12 | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | | | | |
| 水温(℃) | 28.9 | 8.5 | 19.2 | 12 | 30.9 | 10.4 | 19.9 | 12 | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | 56.0 | 53.0 | 54.8 | 4 | 65.0 | 59.0 | 63.0 | 4 | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | 8.8 | 6.0 | 7.7 | 12 | 3.9 | 2.2 | 2.8 | 12 | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 003 高知県<br>須崎市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>上分落合<br><br>[水源名]<br>上分落合<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 123 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 003 高知県<br>須崎市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>安和第1<br><br>[水源名]<br>安和第1<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 186 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 003 高知県<br>須崎市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>安和第2<br><br>[水源名]<br>安和第2<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 6 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | −1.8 | 1 | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 003 高知県<br>須崎市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>多ノ郷<br><br>[水源名]<br>多ノ郷<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 148 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 003 高知県<br>須崎市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>吾桑第1<br><br>[水源名]<br>吾桑第1<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,310 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 003 高知県<br>須崎市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>吾桑第2<br><br>[水源名]<br>吾桑第2<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 15 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | <0.001 | 1 | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | <0.002 | 1 | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | <1 | 1 | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | −0.9 | 1 | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 003 高知県<br>須崎市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>久通<br><br>[水源名]<br>久通<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 10(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 003 高知県<br>須崎市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>池ノ浦<br><br>[水源名]<br>池ノ浦<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 36(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 003 高知県<br>須崎市<br><br>[浄水場名] 99 － 00<br>新荘<br><br>[水源名]<br>新荘<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 6,793(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 004 高知県<br>土佐清水市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>加久見浄水場<br><br>[水源名]<br>加久見川水系(加久見川)<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 1,625 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 004 高知県<br>土佐清水市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>立石浄水場<br><br>[水源名]<br>立石川水系(立石川)<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 19 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 004 高知県<br>土佐清水市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>三崎浄水場<br><br>[水源名]<br>三崎川水系(三崎川)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 876 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 32.0 | 13.0 | 21.8 | 12 | 30.0 | 8.0 | 18.7 | 12 | 29.0 | 11.0 | 20.6 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 004 高知県<br>土佐清水市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>浦尻浄水場<br><br>[水源名]<br>浦尻川水系(浦尻川)<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 634(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 004 高知県<br>土佐清水市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>布浄水場<br><br>[水源名]<br>布川水系(布川)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 165(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 004 高知県<br>土佐清水市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>下ノ加江浄水場<br><br>[水源名]<br>下ノ加江川水系(下ノ加江川)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 451(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 27.0 | 15.0 | 19.6 | 12 | 24.0 | 14.0 | 17.9 | 12 | 30.0 | 7.0 | 19.3 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 004 高知県<br>土佐清水市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>久百々浄水場<br><br>[水源名]<br>久百々川水系(久百々川)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 183(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 004 高知県<br>土佐清水市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>以布利浄水場<br><br>[水源名]<br>以布利川系(以布利川)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 224(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 004 高知県<br>土佐清水市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>窪津浄水場<br><br>[水源名]<br>窪津川水系(窪津川)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 150(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 33.0 | 8.0 | 20.7 | 12 | 26.5 | 5.0 | 19.8 | 12 | 31.0 | 8.0 | 19.6 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 004 高知県<br>土佐清水市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>足摺浄水場<br><br>[水源名]<br>西川水系(西川)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 352(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 004 高知県<br>土佐清水市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>松尾浄水場<br><br>[水源名]<br>天神川水系(天神川)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 203(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 004 高知県<br>土佐清水市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>臼婆浄水場<br><br>[水源名]<br>払川水系(払川)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 26(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 31.0 | 10.0 | 20.4 | 12 | 29.0 | 11.0 | 19.7 | 12 | 29.0 | 10.5 | 19.7 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 004 高知県<br>土佐清水市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>大浜浄水場<br><br>[水源名]<br>奥ノ川水系(奥ノ川)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 37(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 004 高知県<br>土佐清水市<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>中浜浄水場<br><br>[水源名]<br>音無川水系(音無川)<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 270(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 004 高知県<br>土佐清水市<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>上野浄水場<br><br>[水源名]<br>益野川水系(益野川)<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 51(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 26.0 | 10.0 | 17.8 | 12 | 27.0 | 12.0 | 18.9 | 12 | 28.5 | 15.0 | 21.1 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 004 高知県<br>土佐清水市<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>下川口浄水場<br><br>[水源名]<br>宗呂川水系(宗呂川)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 130(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 004 高知県<br>土佐清水市<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>宗呂浄水場<br><br>[水源名]<br>宗呂川水系(宗呂川)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 96(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 004 高知県<br>土佐清水市<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>貝ノ川浄水場<br><br>[水源名]<br>貝ノ川川水系(貝ノ川川)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 125(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 30.0 | 9.0 | 19.7 | 12 | 31.0 | 10.0 | 21.1 | 12 | 24.0 | 16.0 | 20.1 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 004 高知県<br>土佐清水市<br><br>[浄水場名] 19 － 00<br>斧積浄水場<br><br>[水源名]<br>三崎川水系(三崎川)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 23(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 004 高知県<br>土佐清水市<br><br>[浄水場名] 20 － 00<br>津呂・権現浄水場<br><br>[水源名]<br>琴川水系(琴川)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 94(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 006 高知県<br>宿毛市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>宿毛上水道配水池<br><br>[水源名]<br>宿毛上水道水源池<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 6,419(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 30.0 | 11.0 | 20.4 | 12 | 33.0 | 7.0 | 20.1 | 12 | 31.0 | 11.0 | 21.1 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 006 高知県<br>宿毛市<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>東部広域地区配水池<br><br>[水源名]<br>東部広域地区水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,260(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 006 高知県<br>宿毛市<br><br>[浄水場名] 01 － 02<br>山北地区配水池<br><br>[水源名]<br>山北地区水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 18(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 007 高知県<br>安芸市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>安芸配水池<br><br>[水源名]<br>安芸水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,135(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 26.0 | 10.0 | 19.3 | 12 | 31.0 | 9.0 | 19.5 | 12 | 31.1 | 8.5 | 21.0 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 007 高知県<br>安芸市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>第三水源池<br><br>[水源名]<br>第三水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,248 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 007 高知県<br>安芸市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>川北水源池<br><br>[水源名]<br>川北水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,037 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 007 高知県<br>安芸市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>赤野水源池<br><br>[水源名]<br>赤野水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 22 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 29.9 | 8.2 | 19.8 | 12 | 31.6 | 10.7 | 21.5 | 12 | 32.0 | 8.8 | 21.0 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 007 高知県<br>安芸市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>井ノ口水源池<br><br>[水源名]<br>井ノ口水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 123(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 007 高知県<br>安芸市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>入河内水源池<br><br>[水源名]<br>入河内水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 12(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 007 高知県<br>安芸市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>大井水源池<br><br>[水源名]<br>大井水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 31.5 | 6.0 | 19.6 | 12 | 36.0 | 4.8 | 20.0 | 12 | 30.0 | 7.8 | 18.9 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 008 高知県<br>室戸市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>古戸<br><br>[水源名]<br>古戸水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,241 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 008 高知県<br>室戸市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>東の川<br><br>[水源名]<br>東の川水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 552 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 008 高知県<br>室戸市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>原池<br><br>[水源名]<br>原池水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 618 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 365 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 365 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 365 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 008 高知県<br>室戸市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>山田<br><br>[水源名]<br>山田水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,643 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 008 高知県<br>室戸市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>入木<br><br>[水源名]<br>入木水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 23 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 008 高知県<br>室戸市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>佐喜浜<br><br>[水源名]<br>佐喜浜水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 356 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 365 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 365 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 365 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 008 高知県<br>室戸市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>尾崎<br><br>[水源名]<br>尾崎水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 35 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 008 高知県<br>室戸市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>椎名<br><br>[水源名]<br>椎名水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 149 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 008 高知県<br>室戸市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>崎山<br><br>[水源名]<br>崎山水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 172 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 365 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 365 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 365 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 008 高知県<br>室戸市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>中ノ川<br><br>[水源名]<br>中ノ川水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 12(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 008 高知県<br>室戸市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>西地<br><br>[水源名]<br>不動水源・西地予備水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 15(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 008 高知県<br>室戸市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>長野・磯原<br><br>[水源名]<br>悪坂水源・法師水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 20(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 365 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 365 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 365 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 008 高知県<br>室戸市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>羽根<br><br>[水源名]<br>羽根水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 584 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 008 高知県<br>室戸市<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>中川内<br><br>[水源名]<br>中川内水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 12 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 009 高知県<br>香美市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>八王子配水池<br><br>[水源名]<br>戸板島水源地(地下水)<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 4,973 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 365 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 365 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>窪川<br><br>[水源名]<br>四万十川<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 1,879 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>北辰<br><br>[水源名]<br>北辰<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 169 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>仁井田<br><br>[水源名]<br>仁井田<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 620 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 30.0 | 8.0 | 19.1 | 12 | 28.0 | 9.9 | 18.9 | 12 | 29.2 | 9.6 | 19.4 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>道徳<br><br>[水源名]<br>道徳<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 17(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>南部<br><br>[水源名]<br>南部<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 350(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>井細川<br><br>[水源名]<br>井細川<br><br>[原水の種類]<br>湖沼水<br><br>[1日平均浄水量] 42(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 23.7 | 7.8 | 15.2 | 12 | 26.7 | 8.0 | 17.5 | 12 | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>中神ノ川<br><br>[水源名]<br>中神ノ川<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 21 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>東又<br><br>[水源名]<br>東又<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 703 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>西部<br><br>[水源名]<br>西部<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 243 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 29.0 | 7.9 | 18.6 | 12 | 33.0 | 13.7 | 19.6 | 12 | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>志和<br><br>[水源名]<br>志和<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 140 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>小室<br><br>[水源名]<br>小室<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 17 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>浦分<br><br>[水源名]<br>浦分<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 172 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 12 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 26.0 | 7.0 | 17.6 | 12 | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>田野々<br><br>[水源名]<br>田野々<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 704(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>大奈路<br><br>[水源名]<br>大奈路<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 118(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>下津井<br><br>[水源名]<br>下津井<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 15(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 29.3 | 8.0 | 19.6 | 12 | 30.7 | 7.1 | 19.4 | 12 | 29.7 | 6.0 | 18.4 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>奥打井川<br><br>[水源名]<br>奥打井川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 14(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>中津川<br><br>[水源名]<br>中津川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 63(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>打井川<br><br>[水源名]<br>打井川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 32(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 23.3 | 8.3 | 17.6 | 12 | 28.8 | 7.7 | 18.5 | 12 | 25.2 | 7.2 | 17.0 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 19 － 00<br>北ノ川<br><br>[水源名]<br>北ノ川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 252(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 20 － 00<br>つづら川<br><br>[水源名]<br>つづら川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 28(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 21 － 00<br>下道<br><br>[水源名]<br>下道<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 9(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 25.5 | 7.2 | 18.2 | 12 | 26.6 | 5.7 | 18.1 | 12 | 32.8 | 8.5 | 20.9 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 22 － 00<br>古味野々<br><br>[水源名]<br>古味野々<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 8(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 23 － 00<br>希ノ川<br><br>[水源名]<br>希ノ川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 38(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 24 － 00<br>尾越<br><br>[水源名]<br>尾越<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 1(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 32.5 | 9.9 | 21.1 | 12 | 23.5 | 4.8 | 16.3 | 12 | 25.0 | 4.0 | 15.2 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 25 － 00<br>井崎<br><br>[水源名]<br>井崎<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 57(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 26 － 00<br>広瀬<br><br>[水源名]<br>広瀬<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 38(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 27 － 00<br>十川<br><br>[水源名]<br>十川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 548(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 30.0 | 4.0 | 17.3 | 12 | 31.0 | 4.0 | 17.5 | 12 | 29.0 | 4.0 | 16.0 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 28 － 00<br>地吉<br><br>[水源名]<br>地吉<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 28(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 29 － 00<br>古城<br><br>[水源名]<br>古城<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 44(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 30 － 00<br>戸川<br><br>[水源名]<br>戸川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 51(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 29.0 | 4.0 | 16.4 | 12 | 31.0 | 5.0 | 17.5 | 12 | 30.0 | 4.0 | 16.6 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 31 － 00<br>昭和<br><br>[水源名]<br>昭和<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 450(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 31 － 01<br>野々川<br><br>[水源名]<br>昭和<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 6(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 32 － 00<br>八木<br><br>[水源名]<br>八木<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 15(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 29.0 | 5.0 | 16.1 | 12 | 32.0 | 5.0 | 17.8 | 12 | 29.0 | 3.0 | 15.8 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 33 － 00<br>四手崎<br><br>[水源名]<br>四手崎<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 13(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 010 高知県<br>四万十町<br><br>[浄水場名] 34 － 00<br>浦越<br><br>[水源名]<br>浦越<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 62(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 011 高知県<br>いの町(伊野)<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>新北山配水池<br><br>[水源名]<br>公園町水源地<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,050(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | 0.000005 | 1 |
| 水温(℃) | 31.0 | 5.0 | 17.6 | 12 | 29.0 | 5.0 | 16.3 | 12 | 28.1 | 6.7 | 18.7 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 011 高知県<br>いの町(伊野)<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>音竹配水池<br><br>[水源名]<br>鎌田水源地<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,809 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 011 高知県<br>いの町(伊野)<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>伊野南配水池<br><br>[水源名]<br>伊野南水源地<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,164 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 011 高知県<br>いの町(伊野)<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>川内配水池<br><br>[水源名]<br>川内水源地<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 950 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | 0.000005 | 1 | | | 0.000005 | 1 | | | 0.000005 | 1 |
| 水温(℃) | 28.9 | 9.8 | 12.9 | 12 | 27.8 | 6.8 | 19.5 | 12 | 28.1 | 9.3 | 19.7 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 011 高知県<br>いの町(伊野)<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>神谷配水池<br><br>[水源名]<br>加田水源地<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 158(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 011 高知県<br>いの町(伊野)<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>鹿敷配水池<br><br>[水源名]<br>鹿敷水源地<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 91(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 011 高知県<br>いの町(伊野)<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>勝賀瀬西の谷配水池<br><br>[水源名]<br>勝賀瀬西の谷水源地<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 28(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | 0.000005 | 1 | | | 0.000005 | 1 | | | 0.000005 | 1 |
| 水温(℃) | 28.0 | 10.9 | 19.6 | 12 | 25.4 | 11.2 | 18.5 | 12 | 23.0 | 10.6 | 17.6 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 011 高知県<br>いの町(伊野)<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>柳瀬配水池<br><br>[水源名]<br>柳瀬水源地<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 25(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 011 高知県<br>いの町(伊野)<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>南浦配水池<br><br>[水源名]<br>下八川水源地<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 98(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 011 高知県<br>いの町(伊野)<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>賢定配水池<br><br>[水源名]<br>賢定水源地(柳野)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 26(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | 0.000005 | 1 | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 24.9 | 11.9 | 18.8 | 12 | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 011 高知県<br>いの町(伊野)<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>小川配水池<br><br>[水源名]<br>小川水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 71 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 011 高知県<br>いの町(伊野)<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>高岩配水池<br><br>[水源名]<br>高岩水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 76 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 011 高知県<br>いの町(伊野)<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>柿藪総合配水池<br><br>[水源名]<br>下柿藪谷水源地(上八川)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 123 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 011 高知県<br>いの町(伊野)<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>槙川配水池<br><br>[水源名]<br>槙川水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 5(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 011 高知県<br>いの町(伊野)<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>土居配水池<br><br>[水源名]<br>土居水源地(土居日比原)<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 47(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 011 高知県<br>いの町(伊野)<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>大森配水池<br><br>[水源名]<br>大森谷水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 10(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 12 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | 0.000005 | 1 |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 011 高知県<br>いの町(伊野)<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>長沢配水池<br><br>[水源名]<br>長沢水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 78(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 011 高知県<br>いの町(伊野)<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>越裏門配水池<br><br>[水源名]<br>越裏門水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 83(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 011 高知県<br>いの町(伊野)<br><br>[浄水場名] 19 － 00<br>寺川配水池<br><br>[水源名]<br>寺川水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 5(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | 0.000005 | 1 | | | 0.000005 | 1 | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 011 高知県<br>いの町(伊野)<br><br>[浄水場名] 20 － 00<br>大橋配水池<br><br>[水源名]<br>大橋水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 44 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 013 高知県<br>土佐市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>天崎(高岡)<br><br>[水源名]<br>天崎水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,703 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 013 高知県<br>土佐市<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>中島(宇佐・新居)<br><br>[水源名]<br>中島水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,491 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 013 高知県<br>土佐市<br><br>[浄水場名] 03 － 02<br>天崎(西部)<br><br>[水源名]<br>天崎水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,654 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 013 高知県<br>土佐市<br><br>[浄水場名] 04 － 03<br>戸波(西部)<br><br>[水源名]<br>戸波水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 412 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 013 高知県<br>土佐市<br><br>[浄水場名] 05 － 04<br>中島(統合)<br><br>[水源名]<br>中島第二水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,100 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 014 高知県<br>佐川町<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>室原取水施設<br><br>[水源名]<br>柳瀬川水系<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,148 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 014 高知県<br>佐川町<br><br>[浄水場名] 03 － 02<br>新室原取水施設<br><br>[水源名]<br>柳瀬川水系<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,752 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 014 高知県<br>佐川町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>尾川取水施設<br><br>[水源名]<br>柳瀬川水系<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 166 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 365 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 365 | 0.4 | <0.1 | 0.2 | 365 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 32.0 | 8.5 | 20.0 | 12 | 30.5 | 9.5 | 19.9 | 12 | 28.5 | 10.0 | 19.3 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 014 高知県<br>佐川町<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>黒岩取水施設<br><br>[水源名]<br>柳瀬川水系<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 260 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 016 高知県<br>香南市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>第1水源地<br><br>[水源名]<br>第1水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,308 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 016 高知県<br>香南市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>第2水源地<br><br>[水源名]<br>第2水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,532 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | <0.1 | 0.2 | 365 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 32.0 | 10.0 | 20.4 | 12 | 28.0 | 9.5 | 19.8 | 12 | 30.9 | 10.9 | 21.6 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 016 高知県<br>香南市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>第3水源地<br><br>[水源名]<br>第3水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,454 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 016 高知県<br>香南市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>第4水源地<br><br>[水源名]<br>第4水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 115 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 016 高知県<br>香南市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>第5水源地<br><br>[水源名]<br>第5水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,126 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 10 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 22.8 | 16.9 | 19.5 | 12 | 29.6 | 16.0 | 22.5 | 10 | 27.6 | 16.5 | 21.4 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 016 高知県<br>香南市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>第3水源地下高田補助水源<br><br>[水源名]<br>第3水源下高田補助水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,131 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 016 高知県<br>香南市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>第3水源地切石補助水源<br><br>[水源名]<br>第3水源切石補助水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 425 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 016 高知県<br>香南市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>第3水源地ポリテクカレッジ<br><br>[水源名]<br>第3水源ポリテクカレッジ補助水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 260 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 11 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 21.4 | 18.6 | 19.9 | 12 | 20.5 | 19.1 | 19.7 | 12 | 22.2 | 17.7 | 19.9 | 11 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 016 高知県<br>香南市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>刈谷水源地<br><br>[水源名]<br>刈谷水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 783 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 016 高知県<br>香南市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>和田橋水源地<br><br>[水源名]<br>和田橋水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,224 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 016 高知県<br>香南市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>朝日谷水源地<br><br>[水源名]<br>朝日谷水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 56 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 31.3 | 10.7 | 21.0 | 12 | 28.9 | 11.3 | 19.9 | 12 | 26.5 | 7.8 | 17.3 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 016 高知県<br>香南市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>赤岡水源地<br><br>[水源名]<br>赤岡水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,407 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 016 高知県<br>香南市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>吉川水源地<br><br>[水源名]<br>吉川水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 812 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 016 高知県<br>香南市<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>坪井水源地<br><br>[水源名]<br>坪井水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 271 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | 28.7 | 11.2 | 19.6 | 12 | 29.7 | 12.8 | 20.6 | 12 | 34.3 | 9.8 | 21.7 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 016 高知県<br>香南市<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>出口水源地<br><br>[水源名]<br>出口水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 464 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 016 高知県<br>香南市<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>十ノ木水源地<br><br>[水源名]<br>十ノ木水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 980 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 017 高知県<br>南国市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>南国市上水道(大篠)<br><br>[水源名]<br>大篠水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,717 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | <0.0020 | 1 |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | <0.002 | 1 |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | <0.0004 | 1 |
| トルエン | | | | | | | | | | | <0.040 | 1 |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | <0.008 | 1 |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | <0.002 | 1 |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 12 | | | 0.2 | 1 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | 25.4 | 1 |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | <0.030 | 1 |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | <0.002 | 1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | <0.1 | 1 |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | <1 | 1 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | −1.9 | 1 |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | 3 | 1 |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | <0.0100 | 1 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | <0.000005 | 1 |
| 水温(℃) | 30.9 | 12.7 | 22.0 | 12 | 28.8 | 10.2 | 20.2 | 12 | 30.0 | 13.0 | 20.8 | 12 |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 017 高知県<br>南国市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>南国市上水道(南部)<br><br>[水源名]<br>南部水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,535 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 017 高知県<br>南国市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>南国市上水道(中部)<br><br>[水源名]<br>中部水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,491 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 019 高知県<br>黒潮町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>有井川配水池<br><br>[水源名]<br>有井川<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | <0.0020 | 1 | | | <0.0020 | 1 | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | | |
| トルエン | | | <0.040 | 1 | | | <0.040 | 1 | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| 抱水クロラール | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | 0.2 | 1 | | | 0.2 | 1 | | | | |
| 遊離炭酸 | | | 29.6 | 1 | | | 11.8 | 1 | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | <0.030 | 1 | | | <0.030 | 1 | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 0.2 | 1 | | | 0.2 | 1 | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | <1 | 1 | | | <1 | 1 | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | −1.7 | 1 | | | −1.8 | 1 | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | 0 | 1 | | | 16 | 1 | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | <0.0100 | 1 | | | <0.0100 | 1 | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | 0.000008 | 1 | | | <0.000005 | 1 | | | | |
| 水温(℃) | 24.0 | 13.0 | 19.8 | 12 | 27.0 | 13.0 | 20.3 | 12 | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 019 高知県<br>黒潮町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>上川口配水池<br><br>[水源名]<br>蜷川<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,720 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 019 高知県<br>黒潮町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>鞭配水池<br><br>[水源名]<br>湊川<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,809 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 019 高知県<br>黒潮町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>大井川浄水場<br><br>[水源名]<br>大井川水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 25 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 019 高知県<br>黒潮町<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>湊川浄水場<br><br>[水源名]<br>湊川<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 44(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 019 高知県<br>黒潮町<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>仲分川浄水場<br><br>[水源名]<br>仲分川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 10(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 019 高知県<br>黒潮町<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>蜷川浄水場<br><br>[水源名]<br>蜷川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 41(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 019 高知県<br>黒潮町<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>佐賀配水池<br><br>[水源名]<br>佐賀水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,191(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 019 高知県<br>黒潮町<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>熊野浦浄水場<br><br>[水源名]<br>熊野浦水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 10(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 019 高知県<br>黒潮町<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>鈴浄水場<br><br>[水源名]<br>鈴水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 18(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 12 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 019 高知県<br>黒潮町<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>伊与喜浄水場<br><br>[水源名]<br>伊与喜水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 135(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 019 高知県<br>黒潮町<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>荷稲浄水場<br><br>[水源名]<br>荷稲水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 55(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>39 － 019 高知県<br>黒潮町<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>拳ノ川浄水場<br><br>[水源名]<br>拳ノ川水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 39(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12 |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>39 － 019 高知県<br>黒潮町<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>市野瀬浄水場<br><br>[水源名]<br>市野瀬水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 16(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>－<br><br>[浄水場名] －<br><br>[水源名]<br><br>[原水の種類]<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>－<br><br>[浄水場名] －<br><br>[水源名]<br><br>[原水の種類]<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 1,2－ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | |
| 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | |
| 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | |
| 農薬類 | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 12 | | | | | | | | |
| 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1－トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | |
| メチル－t－ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | | | | | | | |
| 臭気強度(TON) | | | | | | | | | | | | |
| 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | | | | | | | |
| 従属栄養細菌 | | | | | | | | | | | | |
| 1,1－ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | | | | | | | | | | | |
| 水温(℃) | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | | | | | | | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | | | | | | | | | | | | |
| 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) | | | | | | | | | | | | |
| 浮遊物質(SS) | | | | | | | | | | | | |
| 侵食性遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | | | | | | | | | | | | |
| リン酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 生物(n/ml) | | | | | | | | | | | | |
| アルカリ度 | | | | | | | | | | | | |
| 溶存酸素 | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸イオン | | | | | | | | | | | | |
| 溶性ケイ酸 | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。